Инструкция по применению
Ременс Капли гомеопатические 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Австрия
Производитель: Биттнер Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Действующее вещество: Цимицифуга кистевидная (Cimicifuga) D1 5 мл, сангвинария канадская (Sanguinaria) D6 10 мл, пилокарпус (Jaborandi) D6 10 мл, секрет железы, каракатицы (Sepia) D12 10 мл, яд змеи сурукуку (Lachesis) D12 10 мл.
Вспомогательные вещества: этанол 43% (по массе) - 55 мл. Концентрация действующего вещества (%): 100%

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Комплексный гомеопатический препарат. Регулирует баланс системы гипоталамус-гипофиз-яичники, нормализует менструальный цикл, регулирует интенсивность кровотечений, уменьшает проявления альгодисменореи, ослабляет проявления синдрома предменструального напряжения (эмоциональную лабильность, раздражительность, агрессивность, депрессию, плаксивость), уменьшает отечный синдром. При климактерическом синдроме Ременс уменьшает психоэмоциональные проявления (эмоциональную лабильность, обидчивость, агрессивность, депрессию, плаксивость, нарушения сна), вегетативные (приливы, гипергидроз, приступы сердцебиения, кардиалгии, колебания АД) и обменные нарушения (нормализует жировой обмен, препятствует нарастанию массы тела, уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний). Ременс оказывает противовоспалительное действие на ткани яичников и эндометрий, улучшает микроциркуляцию органов малого таза.

Показания

В составе комплексной терапии при: нарушениях менструального цикла (в т. ч. вторичной аменорее, дисменорее, синдроме предменструального напряжения), климактерическом синдроме, эндометрите, аднексите.

Способ применения и дозы

При нарушениях менструального цикла (в т. ч. при вторичной аменорее, дисменорее, синдроме предменструального напряжения) взрослым и подросткам назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раз в сутки. Длительность лечения - 3 мес. При необходимости курс лечения можно повторить через 1 мес. При климактерическом синдроме назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раз в сутки. Длительность лечения - не менее 6 мес. При стабилизации состояния препарат назначают 1-2 раз в сутки. При хронических воспалительных заболеваниях женских половых органов взрослым и подросткам назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раз в сутки. Длительность лечения - 3 мес. При необходимости курс лечения можно повторить через 1 мес. В начале заболевания и в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием препарата по 8-10 капель каждые 0. 5-1 ч, но не более 8 раз в сутки. После улучшения состояния препарат назначают 3 раз в сутки. Препарат принимают за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи. Капли принимают в чистом виде или разводят в 1 столовой ложке воды, подержав 20-30 сек во рту перед проглатыванием. Таблетку следует держать под языком до полного рассасывания.

Противопоказания

Детский возраст до 12 лет (из-за недостаточности клинических данных). Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Вопрос о применении препарата Ременс при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается врачом индивидуально.

Побочные действия

Редко: повышенное слюноотделение. Пациент должен быть информирован о том, что при возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Нет данных о взаимодействии Ременса с другими средствами.

Особые указания

Ременс капли. В начале лечения могут отмечаться проявления незначительного усиления симптомов заболевания, не являющиеся угрожающими и не требующие отмены препарата. Если у пациента появились симптомы заболевания печени (желтуха, темный цвет мочи, боль в верхней части живота, тошнота, снижение аппетита, слабость),следует прекратить прием капель. В связи с содержанием спирта в препарате его следует применять с осторожностью у пациентов с высоким риском развития патологии печени и эпилепсии. Поскольку Ременс в форме капель содержит растительные природные компоненты, при хранении может отмечаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета р-ра, не приводящее к снижению эффективности препарата. Препарат Ременс в форме капель не следует применять у пациентов с алкогольной зависимостью. Применение в период беременности и кормления грудью. Информация о каком-либо риске для плода и ребенка от приема препарата в период беременности и кормления грудью до сих пор не зарегистрирована. Препарат Ременс в форме таблеток и капель не следует назначать в период беременности и кормления грудью. Дети. Препарат назначают детям в возрасте старше 12 лет. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Ременс таблетки: препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Ременс капли: несмотря на содержание спирта, препарат в рекомендуемых дозах не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Следует учитывать, что содержание спирта в препарате в форме капель составляет 43% (м/м).

Условия хранения

В сухом месте