Инструкция по применению
РемоВакс Аккорд Капсулы 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Финн Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60



Описание

Причины нарушений слуха чаще всего многофакторны - перенесенные инфекции, последствия приема ототоксических препаратов, чаще всего антибиотиков, сосудистые заболевания, атеросклероз, нарушения обмена гомоцистеина, возрастные нарушения слуха (пресбиакузис), нарушения слуха при сахарном диабете, шумовая, вибрационная тугоухость. Во всех случаях рано или поздно происходят дистрофические и некробиотические изменения в клеточных структурах внутреннего уха и проводящих отделах. Шум в ушах может быть также признаком нехватки в организме витамина B12 (цианокобаламина), при его дефиците человек может ощущать звон, жужжание, шипение, гудение или пульсацию в ушах. Возрастное снижение слуха называют пресбиакузисом, оно встречается в пожилом возрасте из-за проблем обмена веществ и сосудистых нарушений. Это очень распространенное явление. К примеру, если среди 40-50-летних плохо слышат всего 6%, то среди людей в возрасте 50-60 лет нарушен слух уже у 25%. У 60-70-летних тугоухость отмечается у 40%, а после 70 лет ее имеют уже более 50% людей. В отличие от старческой дальнозоркости, которую можно откорректировать с помощью очков, старческая тугоухость — явление гораздо более коварное. Этот процесс развивается очень медленно, часто незаметно для самого человека и охватывает все части органа слуха. Поражаются и среднее ухо, которое усиливает звуки, и внутреннее ухо, превращающее звуковые импульсы в электрические сигналы, и нервы, по которым электрические сигналы проходят в головной мозг, и слуховые центры в коре головного мозга, которые эти сигналы расшифровывают. В результате пожилой человек перестает слышать тихие голоса, высокочастотные звуки (например, пение

птиц или телефонные звонки), плохо различает в разговоре похожие согласные. Это приводит к трудностям в общении с другими людьми, эмоциональной подавленности, ускоряет процесс интеллектуального угасания.Еще одной из наиболее частых причин, на которую можно повлиять является избыточное накопление гомоцистеина, аминокислоты, являющейся промежуточным продуктом метаболизма других аминокислот (метионина и цистеина). Повышенный уровень гомоцистеина у взрослых и даже детей ассоциирован с патологическими нарушениями, причинами которых могут быть генетические мутации и дефицит ряда ферментов. Часто повышение уровня гомоцистеина связано с алиментарными факторами, как-то дефицит фолиевой кислоты, витамина B12 и с дефицитом витамина B6, который влияет на метаболизм метионина. Механизмы, лежащие в основе нейро- и ототоксичности гомоцистеина, включают окислительный стресс, повреждение ДНК, тиолирование белка или гомоцистеинилирование белка, вызывающие апоптоз и эксайтотоксичность. Последние данные указывают также на то, что воспаление на фоне гомоцистеинемии сопровождается повышением уровня ряда цитокинов и изменением в метилировании ДНК. Все это суммарно оказывает повреждающее воздействие на клетки многих органов и систем организма человека1. Восполнить дефицит ряда важных витаминов и микроэлементов - крайне важно для профилактики заболеваний органа слуха, как в пожилом возрасте на фоне атеросклеротического процесса, так и при первых симптомах снижения слуха в любых возрастных группах. Компонентный состав БАД РемоВакс АККОРД подобран с учетом его действия на различные причины нарушений слуха. Активные Компоненты комплекса РемоВакс АККОРД способствуют: Профилактике накопления гомоцистеина Снижению риска потери слуха (риска развития нейросенсорной тугоухости) Снижению риска шума в ушах Восполнению дефицита микроэлементов, необходимых для нормализации работы слухового анализатора Профилактике инфекций внутреннего уха за счет активизации иммунной системы человека и мобилизации защитных сил организма Улучшению кровообращения, насыщения тканей кислородом, обмена веществ в клетках головного мозга и его периферических структур, к которым относится и орган слуха, улучшению энергетического обмена в клетках слухового анализатораРесвератрол: предотвращает потерю слуха и специфическое снижение уровня транспортера обратного захвата серотонина (SERT), вызванное воздействием шума на центральную слуховую систему. Исследования показывают, что воздействие шума негативно влияет на уровни SERT в трёх областях слухового мозга и обратимо повышает порог слышимости, а лечение ресвератролом предотвращает потерю SERT и повышение порога слышимости под воздействием шума. Ресвератрол не только оказывает защитное действие на порог слышимости, но и защищает уровни SERT. Его можно использовать в качестве потенциальной профилактики или дополнения при лечении заболеваний слуха, связанных с потерей SERT2.Ресвератрол также проявляет

антиоксидантное, нейропротективное, метаболическое, противовоспалительное действие, помогает предотвратить преждевременное старение организма, обеспечивает защиту клеток от апоптоза под действием индукторов окислительного стресса, уменьшает активность перекисного окисления липидов и деструкцию нервных клеток в тканях головного мозга, проявляет комплексное действие при головных болях, головокружении, шуме в ушах, снижении слуха. Экстракт Гинкго Билоба: экстракт Гинкго Билоба обладает широким спектром биологической активности, что позволяет использовать его при различных патологических состояниях. Экстракт Гинкго Билоба используют как средство для лечения мозговых дисфункций с такими симптомами, как ухудшение памяти, головокружение, шум в ушах, и т.д. Он также применяется при сосудистых заболеваниях уха, снижении слуха. Применение Гинкго Билоба замедляет процесс старения организма, способствует восстановлению эластичности и прочности сосудов и оптимизирует выделение нейромедиаторов, а также нормализует обмен веществ нервных клеток. Исследованиями показано, что кохлеовестибулярные расстройства с сосудистым компонентом могут также являться показаниями для приема Гинкго Билоба. Экстракты Гинкго Билоба часто используются для симптоматической или вспомогательной терапии пациентов с шумом в ушах3-9. Экстракт Гинкго Билоба и кверцетин стимулируют капиллярное кровообращение и обменные процессы в тканях головного мозга и органа слуха, уменьшают проницаемость и ломкость капилляров. По данным некоторых исследований включение Гинко Билоба в комплексную терапию улучшает функцию слуха также у пациентов с SSNHL (внезапная нейросенсорная тугоухость) 10,11.Кофермент Q10: повышает иммунитет, улучшает оксигенацию тканей (насыщение тканей кислородом), обеспечивает улучшение энергетического обмена в клетках слухового анализатора. По данным исследований в комплексной терапии коэнзим Q10 может оказывать благотворное влияние при лечении внезапной сенсоневральной потери слуха12.Бетаин: дефицит бетаин-гомоцистеиновой S-метилтрансферазы повышает вероятность вызванной шумом потери слуха. Бетаин нейтрализует токсичную аминокислоту гомоцистеин. Как отмечено выше, гомоцистенин опасен и тем, что его уровень в крови с возрастом повышается, что способствует развитию атеросклероза, гипертонии и нейросенсорной тугоухости13. Марганец, селен, витамин Е: необходимы для профилактики нарушения работы слухового анализатора. Вместе с витаминами группы В, Марганец и селен способствуют восстановительным процессам в нервной ткани и проведению импульсов по нервным волокнам. Недостаток этих микроэлементов и витаминов может вызвать потерю слуха. Например, анализ статуса пациентов с сенсоневральной тугоухостью в исследованиях показывает, что у них было существенно понижено содержание природного антиоксиданта токоферола18. В исследованиях также доказано, что включение в терапию витамина Е и селена было эффективным у

пациентов с идиопатической сенсоневральной тугоухостью14,15. Витамины B1, B6, B9 (фолиевая кислота), B12: комплексное лечение сенсоневральной тугоухости не представляется возможным без активных веществ, способных замедлить развитие нейропатии. Большинство нейротропных витаминов улучшают обменные процессы, усиливают процессы регенерации в нейроэпителии, участвуют в важнейших биохимических процессах миелинизации нервных волокон и могут способствовать улучшению функционального состояния кохлеовестибулярного нерва. Витамины группы В участвуют в проведении импульса по волокнам слухового нерва, улучшают крово

Состав

Бетаина гидрохлорид (из корнеплодов свеклы), янтарная кислота, оболочка капсулы (желатин), микрокристаллическая целлюлоза (носитель), витамин Е (D, L-альфа токоферола ацетат), ресвератрол (сухой экстракт корня горца гребенчатого/японского (Polygonum cuspidatum)), дигидрокверцетин (из древесины лиственницы (Larix)), коэнзим Q10, L-селенометионин, экстракт листьев Гинкго Билоба (Ginkgo biloba), марганца бисглицинат, кальциевая соль стеариновой кислоты (агент антислеживающий), витамин В12 (метилкобаламин), витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат), витамин В1 (тиамина гидрохлорид), L-метилфолат кальция, биотин.При потреблении БАД в рекомендуемой дозировке (1 капсула) в организм поступает (в среднем):Биологически Активное Вещество (БАВ) - Содержание - % от РУСП* Селен (в форме L-селенометионин) - 150 мкг - 214 */***Витамин Е - 25 мг - 250 */***Витамин В12 (в форме метилкобаламин) - 8 мкг - 800 */***Витамин В6 (в форме пиридоксаль-5-фосфат) - не более 6 мг - 300 */***Витамин В1 - 4 мг - 286 */***Фолиевая кислота (в форме L-метилфолат кальция) - 430 мкг - 215 */***Биотин - 85 мкг - 170 */***Биологически Активное Вещество (БАВ) - Содержание - % от АУП** Марганец (в форме марганца бисглицинат) - 2,6 мг - 130 **/***Бетаин (в форме бетаина гидрохлорид (из корнеплодов свеклы)) - 166 мг - 8 **Янтарная кислота - 147 мг - 74 **Ресвератрол (сухой экстракт корня горца гребенчатого/японского (Polygonum cuspidatum)) - 37,2 мг - 124 **/***Дигидрокверцетин (из древесины лиственницы (Larix)) - 27 мг - 108 **/***Коэнзим Q10 - 29 мг - 97 **Флавонолгликозиды - 4,8 мг - 16 *** % от рекомендуемого уровня суточного потребления, согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», приложение 2,** % от адекватного уровня потребления, согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», приложение 5,*** не превышает верхний допустимый уровень потребления в сутки, согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», приложение 5.Пищевая энергетическая ценность в суточной дозировке БАД не превышает 2% от среднесуточной потребности человека в белках, жирах, углеводах и энергии.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника селена, марганца, витаминов Е, В1, В6, В12, биотина, фолиевой кислоты, источника янтарной кислоты, ресвератрола, дигидрокверцетина, коэнзима Q10, флавонолгликозидов.

Способ применения и дозы

Взрослым: по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Возможны повторные приемы в течение года.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке изготовителя, в сухом, недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°С.