Инструкция по применению
Ренгалин Раствор для приема внутрь 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: МАТЕРИА МЕДИКА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Антитела к брадикинину+Антитела к гистамину+Антитела к морфину
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 48.0

Описание

Бесцветная или почти бесцветная прозрачная жидкость

Действующее вещество

Антитела к брадикинину+Антитела к гистамину+Антитела к морфину

Состав

Действующие вещества: антитела к брадикинину аффинно очищенные – 2 000 ЕМД*, антитела к гистамину аффинно очищенные – 2 000 ЕМД*, антитела к морфину аффинно очищенные – 2 000 ЕМД*. Вспомогательные вещества: гипромеллоза, мальтитол, глицерол, сорбат калия, лимонная кислота безводная, вода очищенная. * ЕМД – единицы модифицирующего действия.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Ренгалин® показан к применению у взрослых и детей от 3-х лет. Продуктивный и непродуктивный кашель при гриппе и ОРВИ, остром фарингите, ларинготрахеите, остром обструктивном ларингите, хроническом бронхите, хронической обструктивной болезни легких и других инфекционно-воспалительных и аллергических заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей.

Способ применения и дозы

Внутрь. На один прием – 1-2 чайных ложки (5-10 мл) – вне приема пищи. Желательно держать раствор во рту перед проглатыванием для максимального эффекта препарата. Применять по 1-2 чайных ложки 3 раза в сутки. В зависимости от тяжести состояния в первые три дня частота приема может быть увеличена до 4-6 раз в сутки. Длительность терапии зависит от тяжести заболевания и определяется лечащим врачом.

Противопоказания

Детский возраст до 3-х лет. Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Наследственная непереносимость фруктозы (вследствие наличия в составе мальтитола). С осторожностью Сахарный диабет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Безопасность применения препарата Ренгалин® у беременных и в период грудного вскармливания не изучалась. При беременности и в период грудного вскармливания препарат применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Соотношение польза/риск определяется лечащим врачом.

Особые указания

Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат. При необходимости возможно сочетание с муколитиками. Больным сахарным диабетом следует помнить, что каждая чайная ложка (5 мл) препарата содержит 0,3 г мальтитола, что соответствует 0,02 хлебным единицам (ХЕ). Для метаболизма мальтитола необходим инсулин, хотя благодаря медленному гидролизу и всасыванию в желудочно-кишечном тракте потребность в инсулине мала. Энергетическая ценность мальтитола 10 кДж или 2,4 ккал/г, что существенно меньше, чем у сахарозы. Энергетическая ценность одной чайной ложки препарата составляет приблизительно 5,7 кДж (1,37 ккал).

Срок хранения после открытия

При температуре не выше 25 °С. После вскрытия флакон хранить при температуре не выше 25 °С в течение 35 дней. Не замораживать.

Условия хранения

В сухом месте