Инструкция по применению
Рениприл таблетки 20 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Эналаприл
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 20 мг



Действующее вещество

Эналаприл

Состав

Эналаприла малеат 20 мг

Форма выпуска

Таблетки

Показания

— различные формы артериальной гипертензии (в т.ч. реноваскулярная) . — хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной терапии).

Способ применения и дозы

Рениприл назначают внутрь независимо от приема пищи. При лечении эссенциальной артериальной гипертензии начальная доза Рениприла составляет 10-20 мг/сут. В дальнейшем дозу подбирают индивидуально. При умеренной артериальной гипертензии достаточно дозы 10 мг/сут. Максимальная суточная доза – 80 мг. При реноваскулярной гипертензии Рениприл назначают в меньших дозах. Начальная доза обычно составляет 5 мг/сут, затем дозу подбирают индивидуально. Максимальная доза составляет 20 мг/сут. При сердечной недостаточности Рениприл назначают, начиная с 2.5 мг, затем дозу постепенно увеличивают до 10-20 мг (1-2 раза/сут). Длительность лечения зависит от эффективности терапии. Во всех случаях при слишком выраженном снижении АД дозу препарата постепенно снижают. Препарат применяют как при монотерапии, так и в комбинации с другими антигипертензивными препаратами. У пациентов с нарушениями функции почек следует уменьшить разовую дозу или увеличить интервалы между приемами.

Противопоказания

— ангионевротический отек, связанный с применением ингибиторов АПФ (в анамнезе) . — прогрессирующая азотемия при двустороннем стенозе почечных артерий или стенозе артерии единственной почки . — детский возраст . — беременность . — лактация (грудное вскармливание) . — повышенная чувствительность к эналаприлу и другим компонентам препарата . — повышенная чувствительность к другим ингибиторам АПФ.

Применение при беременности и кормлении грудью

Рениприл противопоказан при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: 2-3% - головная боль, головокружение, повышенная утомляемость . редко (при применении в высоких дозах) – бессонница, нервозность, депрессия, нарушение равновесия, парестезии, шум в ушах. Со стороны сердечно-сосудистой системы: менее 2% - артериальная гипотензия, обмороки . редко – аритмии, стенокардия. Со стороны пищеварительной системы: менее 2% - тошнота, диарея . в отдельных случаях – панкреатит, печеночная недостаточность, диспепсия. Аллергические реакции: менее 2% - кожные высыпания . в отдельных случаях – ангионевротический отек (лица, гортани). Со стороны дыхательной системы: сухой кашель, одышка. Со стороны лабораторных показателей: менее 2% - протеинурия, гиперкалиемия, повышение активности печеночных трансаминаз, повышение концентрации билирубина в крови, нейтропения. Прочие: редко (при применении в высоких дозах) – глоссит, выпадение волос, приливы, импотенция . у пациентов с аутоиммунными заболеваниями – агранулоцитоз. Рениприл в целом хорошо переносится и в большинстве случаев не вызывает побочных реакций, требующих отмены препарата.

Особые указания

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: 2-3% - головная боль, головокружение, повышенная утомляемость . редко (при применении в высоких дозах) – бессонница, нервозность, депрессия, нарушение равновесия, парестезии, шум в ушах. Со стороны сердечно-сосудистой системы: менее 2% - артериальная гипотензия, обмороки . редко – аритмии, стенокардия. Со стороны пищеварительной системы: менее 2% - тошнота, диарея . в отдельных случаях – панкреатит, печеночная недостаточность, диспепсия. Аллергические реакции: менее 2% - кожные высыпания . в отдельных случаях – ангионевротический отек (лица, гортани). Со стороны дыхательной системы: сухой кашель, одышка. Со стороны лабораторных показателей: менее 2% - протеинурия, гиперкалиемия, повышение активности печеночных трансаминаз, повышение концентрации билирубина в крови, нейтропения. Прочие: редко (при применении в высоких дозах) – глоссит, выпадение волос, приливы, импотенция . у пациентов с аутоиммунными заболеваниями – агранулоцитоз. Рениприл в целом хорошо переносится и в большинстве случаев не вызывает побочных реакций, требующих отмены препарата.