Инструкция по применению
Ревалгин раствор для инъекций ампулы 5 мл 5 шт

Характеристики



Форма выпуска: Ампулы
Страна: Россия
Производитель: Шрея
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Метамизол натрия+Питофенон+Фенпивериния бромид
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 2,5 г+ 10 мг+ 100 мкг/5 мл

Описание

Ревалгин - анальгезирующее ненаркотическое средство (анальгетик ненаркотический+спазмолитик).

Действующее вещество

Метамизол натрия+Питофенон+Фенпивериния бромид

Состав

метамизол натрий 500 мгпитофенона гидрохлорид 2 мгфенпивериния бромид 20 мкгВспомогательные вещества: натрия метабисульфит, динатрия эдетат, калия дигидрофосфат, натрия гидроксид, вода д/и.

Форма выпуска

Ампулы

Показания

— болевой синдром при спазмах гладкой мускулатуры внутренних органов, в т.ч. почечная колика, печеночная колика, желчная колика, кишечная колика.— дискинезия желчевыводящих путей.— альгодисменорея.Для кратковременного симптоматического лечения:— артралгия.— невралгия.— ишиалгия.В качестве вспомогательного лекарственного средства:— болевой синдром после хирургических вмешательств и диагностических процедур.

Способ применения и дозы

Парентерально (в/в, в/м).Взрослым и подросткам старше 15 лет при острых тяжелых коликах вводят в/в медленно (по 1 мл в течение 1 мин) по 2 мл. при необходимости повторно через 6-8 ч. Для медленного в/в введения обычно достаточно 2 мл препарата.В/м вводят 2 мл раствора 2 раза/сут. суточная не должна превышать 4 мл. Продолжительность лечения не более 5 дней.

Противопоказания

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано: беременность (I триместр и последние 6 недель). период лактации.

Взаимодействие с другими препаратами

Одновременное применение Ревалгина с другими ненаркотическими анальгетиками может привести к взаимному усилению токсических эффектов.Трициклические антидепрессанты, противозачаточные средства для приема внутрь, аллопуринол нарушают метаболизм метамизола в печени и повышают его токсичность. Барбитураты, фенилбутазон и другие индукторы микросомальных ферментов печени ослабляют действие метамизола.Одновременное применение с циклоспорином снижает уровень последнего в крови.Седативные средства и транквилизаторы усиливают обезболивающее действие метамизола натрия.При совместном назначении с Н1-гистаминоблокаторами, бутирофенонами, фенотиазинами, амантадином и хинидином возможно усиление м-холинолитического действия.При совместном применении с этанолом - взаимное усиление эффектов.Одновременное применение с хлорпромазином или другими производными фенотиазина может привести к развитию выраженной гипертермии.Рентгеноконтрастные лекарственные средства и коллоидные кровезаменители не должны применяться во время лечения препаратами, содержащими метамизол натрия.Метамизол натрия, вытесняя из связи с белком пероральные гипогликемические лекарственные средства, непрямые антикоагулянты, глюкокортикостероиды и индометацин, может увеличивать выраженность их действия.Эффект усиливают кодеин, Н2-гистаминоблокаторы и пропранолол (замедляет инактивацию метамизола натрия).Раствор для инъекций фармацевтически несовместим с другими лекарственными средствами.При необходимости одновременного применения указанных и других лекарственных препаратов следует проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В сухом прохладном месте. Беречь от детей. Не подвергать воздействию прямого солнечного света. При комнатной температуре