Инструкция по применению
Ревалгин ТАБС Таблетки 100 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Шрея
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Метамизол натрия+Питофенон+Фенпивериния бромид
Количество в упаковке: 100
Дозировка действующего вещества: 500 мг+ 5 мг+ 0,1 мг
Срок годности: 36

Действующее вещество

Метамизол натрия+Питофенон+Фенпивериния бромид

Состав

1 таблетка содержит: Активное вещество: метамизол 500 мг, питофенона гидрохлорид 5 мг, фенпивериния бромид 100 мкг;Вспомогательные вещества: крахмал, лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, тальк.;20 шт. - стрипы (5) - пачки картонные.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

- слабо или умеренно выраженный болевой синдром при спазмах гладкой мускулатуры внутренних органов - почечная и желчная колики, спазмы кишечника, дисменорея и другие спастические состояния внутренних органов; - для кратковременного симптоматического лечения при головных болях, мигренозных болях, болях в суставах, невралгии, ишиалгии, миалгии; - как вспомогательное средство может применяться для уменьшения болей после хирургических и диагностических вмешательств; - для снижения повышенной температуры тела при простудных и инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Способ применения и дозы

Взрослым и подросткам старше 15 лет назначают внутрь (лучше после еды) по 1-2 таблетки 2-3 раза/сут. Суточная доза не должна превышать 6 таб. Продолжительность приема не более 5 дней.;Увеличение суточной дозы препарата или продолжительности лечения возможно только под наблюдением врача.;У детей препарат применяют только по назначению врача. Дозировка для детей 6-8 лет -1/2 таблетки; для детей 9-12 лет – 3/4 таблетки; для детей 13-15 лет - по 1 таблетке; кратность назначения - 2-3 раза/сут.;Другие режимы дозировок возможны только после консультации с врачом.

Противопоказания

- выраженные нарушения функции печени или почек; - генетическое отсутствие глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы; - тахиаритмия; - закрытоугольная форма глаукомы; - гипертрофия предстательной железы с тенденцией к задержке мочи; - желудочно-кишечная непроходимость; - мегаколон; - заболевания системы крови; - коллаптоидные состояния; - I триместр и последние 6 недель беременности; - период лактации; - повышенная чувствительность к производным пиразолона и другим компонентам препарата.;Таблетки не применяют для детей младше 5 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказание: I триместр и последние 6 недель беременности; период лактации.

Побочные действия

В терапевтических дозах препарат обычно хорошо переносится.;Иногда возможны аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, очень редко - анафилактический шок).;В единичных случаях - чувство жжения в эпигастральной области, сухость во рту, головная боль.;Возможны головокружение, снижение артериального давления, тахикардия, цианоз.;При длительном приеме - случаи нарушения системы крови (тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз).;При склонности к бронхоспазму возможно провоцирование приступа.;О всех побочных эффектах следует сообщать лечащему врачу.

Передозировка

При передозировке препаратом могут наблюдаться следующие симптомы: рвота, ощущение сухости во рту, изменение потовыделения, нарушение аккомодации, артериальная гипотензия, сонливость, спутанность сознания, нарушение функции печени и почек, судороги.;Лечение - симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Одновременное применение Ревалгина с другими ненаркотическими анальгетиками может привести к взаимному усилению токсических эффектов.;Трициклические антидепрессанты, противозачаточные средства для приема внутрь, аллопуринол нарушают метаболизм метамизола в печени и повышают его токсичность.; Барбитураты, фенилбутазон и другие индукторы микросомальных ферментов печени ослабляют действие метамизола.;Одновременное применение с циклоспорином снижает уровень последнего в крови.;Седативные средства и транквилизаторы усиливают обезболивающее действие Ревалгина.;При необходимости одновременного применения указанных и других лекарственных препаратов следует проконсультироваться с врачом.

Особые указания

С осторожностью и под контролем врача следует применять препарат больным с нарушенной функцией печени и/или почек, при склонности к гипотонии, бронхоспазму, а также при повышенной индивидуальной чувствительности к НПВС или ненаркотическим анальгетикам.;При длительном (более недели) применении необходимо контролировать картину периферической крови и показатели функционального состояния печени.;Иногда метаболиты метамизола могут окрашивать мочу в красный цвет.

Условия хранения

Беречь от детей