Инструкция по применению
Ревалид-Тева Капсулы 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Венгрия
Производитель: ТЕВА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Прочие препараты
Количество в упаковке: 30

Действующее вещество

Поливитамины+Прочие препараты

Состав

1 капсула препарата содержит: гомогенизат действующих веществ Действующие вещества: DL-метионин - 100,00 мг L-цистин - 50,00 мг Кальция пантотенат - 50,00 мг Тиамина гидрохлорид - 1,50 мг Пиридоксина гидрохлорид - 10,00 мг П-аминобензойная кислота - 20,00 мг Микроэлементы в хелато-комплексе - 65,00 мг Железо - 2,00 мг Цинк - 2,00 мг Медь - 0,50 мг Проса экстракт - 50,00 мг Пшеницы зародышей экстракт - 50,00 мг Дрожжи медицинские - 50,00 мг Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный 4,50 мг оболочка капсул: желатин 98,00 мг, краситель индигокармин (Е 132) 0,05 мг, краситель хинолиновый желтый (Е 104) 0,11 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Препарат применяется при заболеваниях, сопровождающихся нарушением структуры волос и ногтей и выпадением волос, и способствует: — улучшению поверхностной структуры и внешнего вида волос и уменьшению их ломкости — улучшению трофики волосяных луковиц и ногтей — повышению устойчивости и замедлению выпадения волос в результате воздействия неблагоприятных факторов внешней среды и нежелательных воздействий (механические повреждения воздействие химической природы - окраска волос воздействие рентгеновских и ультрафиолетовых лучей).

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 капсуле 3 раза в день во время еды или после приема пищи. Курс лечения - 3 месяца. По рекомендации врача, при необходимости, терапия препаратом может быть продлена или проведена повторно. В особо тяжелых случаях (при интенсивном или диффузном выпадении волос) предлагается усиленный курс лечения: по 2 капсулы 3 раза в день в течение первого месяца, а затем можно перейти на обычный курс лечения: по 1 капсуле 3 раза в день по рекомендации врача. Дети младше 12 лет - не рекомендуется применение препарата детям младше 12 лет в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Прием препарата Ревалид-Тева в период беременности и в период грудного вскармливания возможен только после тщательной оценки соотношения пользы для матери и возможного риска для плода или новорожденного.

Побочные действия

Нежелательные эффекты классифицированы в соответствии с их частотой развития следующим образом: очень часто (≥ 1/10), часто (≥1/100, но <1/10), нечасто (≥1/1000, но <1/100), редко (≥1/10000, но <1/1000) и очень редко (<1 /10000) частота неизвестна (частоту возникновения явлений нельзя определить на основании имеющихся данных). Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: частота неизвестна: дискомфорт в эпигастральной области, тошнота, боль в животе. Возможны аллергические реакции к компонентам препарата. При дозировке 6 капсул в день могут появляться незначительные нарушения в пищеварении, в этом случае следует сократить дозу до 3 капсул в день.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с сульфаниламидами терапию препаратом Ревалид-Тева следует прекратить (действие сульфаниламидов ингибируется парааминобензойной кислотой). Не следует принимать одновременно препарат Ревалид-Тева и допаминэргические средства, такие как леводопа. Препарат Ревалид-Тева может мешать всасыванию и метаболизму препаратов, содержащих леводопу, и, следовательно, снижать их эффективность.

Особые указания

В случае приема препарата в промежутке между приемами пищи или на голодный желудок может наблюдаться тошнота или легкий дискомфорт в эпигастральной области. Поэтому необходимо строго следовать рекомендуемым способам приема. При приеме 6 капсул в день могут наблюдаться легкие расстройства пищеварения. В данном случае рекомендуется снижение дозы до 3 капсул в день. Информация для пациентов, страдающих сахарным диабетом: 1 капсула = 0,033 хлебных единиц (ХЕ) (6,7 кДж/1,6 ккал). Информация для пациентов, страдающих целиакией: 1 капсула содержит 1 мг глютена.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте!