Инструкция по применению
Ревит-ФС Драже 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Драже
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины
Количество в упаковке: 100



Описание

Драже желто-оранжевого цвета правильной шарообразной формы со слабым характерным запахом. Поверхность драже должна быть ровной, гладкой, однородной по окраске

Действующее вещество

Поливитамины

Состав

Действующие вещества: Ретинола пальмитат (витамин А), Тиамина гидрохлорид (витамин В1), Рибофлавин (витамин В2), Аскорбиновая кислота (витамин С). Вспомогательные вещества: сахароза, мука пшеничная, патока крахмальная, воск пчелиный, тальк, подсолнечное масло, ароматизатор апельсиновый.

Форма выпуска

Драже

Показания

В качестве профилактического средства у детей и взрослых при состояниях, сопровождающихся повышенной потребностью в витаминах А, В1, В2 и С (период интенсивного роста, повышенная физическая или умственная нагрузка, при несбалансированном или неполноценном питании) в комплексной терапии в период выздоровления после перенесенных заболеваний.

Способ применения и дозы

Ревит принимают внутрь через 10-15 минут после еды. Взрослым по 1 драже 3 раза в день. Детям с 3 до 7 лет по 1-2 драже в день, от 7 до 15 лет по 1 драже 2-3 раза в день. Курс лечения 30-60 дней. Курс лечения по рекомендации врача может быть повторен после перерыва (1-3 месяца).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчнокаменная болезнь, хронический панкреатит, гипервитаминоз А, детский возраст до 3-х лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Рекомендовано принимать внутрь, по назначению врача. При беременности и в период грудного вскармливания принимать по 1 драже в день.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Длительное применение очень больших доз Ревита может вызывать гипервитаминоз А (боли в животе, задержки менструации, увеличение печени и селезенки, желудочно-кишечные расстройства, запоры, выпадение волос, зуд, суставные боли, тошнота, рвота, мелкие трещины на губах и уголках рта, сухость кожи). Лечение: прекращение приема препарата, обильное питье, дезинтоксикационная инфузионная терапия. Лечение в домашних условиях или в стационаре назначает врач.

Взаимодействие с другими препаратами

Входящая в состав препарата аскорбиновая кислота может повышать всасывание пенициллина, железа, уменьшать действие гепарина и непрямых антикоагулянтов, увеличивать риск кристаллурии при лечении салицилатами. Всасывание ретинола нарушают нитриты и холестирамин. Тиамин, влияя на процессы поляризации в области нервно-мышечных синапсов, может ослаблять кураreподобное действие. Если Вы принимаете какие-либо другие лекарственные препараты, проконсультируйтесь с врачом о возможности применения и дозы препарата.

Особые указания

Возможно, окрашивание мочи в желтый цвет (совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина). Не принимать одновременно с другими витаминными препаратами во избежании передозировки. Не превышать рекомендованной суточной дозы, при случайном приеме высоких доз следует немедленно обратиться к врачу.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 С. Хранить в недоступном для детей месте.