Инструкция по применению
Ревит Драже 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Драже
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины
Количество в упаковке: 100



Описание

Драже от желтого до желто-оранжевого цвета.

Действующее вещество

Поливитамины

Состав

Состав на одно драже. Действующие вещества: Ретинола пальмитат (витамин А) - 1,38 мг (2500 МЕ) Тиамина гидрохлорид - 1,00 мг Рибофлавин - 1,00 мг Аскорбиновая кислота - 35,00 мг Вспомогательные вещества: Мука пшеничная - 27,47 мг Патока крахмальная - 28,57 мг Сахароза - 404,56 мг Ароматизатор апельсиновый - 0,07 мг Воск пчелиный - 0,13 мг Парафин жидкий - 0,13 мг Тальк - 0,69 мг Масса драже: - 500,00 мг

Форма выпуска

Драже

Показания

Профилактика дефицита витаминов, входящих в состав препарата.

Способ применения и дозы

Внутрь, через 10-15 минут после еды ежедневно в течение 1-2 месяцев. Взрослым - по 1 драже 3 раза в день. Детям от 3 до 7 лет - по 1-2 драже в день, от 7 до 15 лет - по 2-3 драже в день.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дефицит сахаразы /изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст до 3 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение препарата по назначению врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Жирорастворимые витамины могут накапливаться в тканях. При передозировке они более токсичны, чем водорастворимые. Симптомы острой передозировки витамином А (развиваются через 6 ч после приема в дозе от 300 000 ЕД до 1 млн ЕД (120-400 драже) однократно): сонливость, вялость, диплопия, головокружение, сильная головная боль, тошнота, тяжелая рвота, диарея, раздражительность, остеопороз, кровотечение из десен, сухость и изъязвление слизистой оболочки полости рта, шелушение губ, кожи (особенно ладоней), возбуждение, спутанность сознания. Клиника обратима. Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучалось.

Особые указания

Не рекомендуется одновременный прием других поливитаминных комплексов во избежание передозировки. Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.