Инструкция по применению
Ревма-гель Гель 50 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Германия
Производитель: Альпен Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачный гель желто-коричневого цвета, со слабым от сладковатого до пряного запахом.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

На 100 г геля: активные компоненты: Toxicodendron quercifolium / Rhus toxicodendron extern (токсикодендрон кверцифолиум / рус токсикодендрон экстерн) 5 г, Ledum palustre / Ledum extern (ледум палюстре / ледум экстерн) 5 г, Symphytum ad usum externum (симфитум ад узум экстернум) 10 г, вспомогательные компоненты: раствор гидроксида натрия 32% 1,094 г, карбомер (карбопол 980 NF) 1,000 г, вода очищенная 77,906 г.

Форма выпуска

Гель

Показания

В комплексной терапии воспалительных заболеваний суставов, болей в мышцах, растяжений мышц, а также люмбаго (болей в пояснично- крестцовом отделе позвоночника).

Способ применения и дозы

Наружно. Взрослым и детям старше 1 года наносить гель 3 раза в день на болезненные места, слегка втирая в кожу. При острых состояниях (боли в мышцах, растяжения мышц, люмбаго) продолжительность лечения составляет от 1 до 2 недель. При хронических состояниях (воспалительные заболевания суставов) продолжительность лечения составляет от 4 до 6 недель. Повторные курсы лечения хронических состояний, а также увеличение длительности применения препарата рекомендуется проводить после консультации с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к Rhus toxicodendron (рус токсикодендрон). Детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применять только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и/или ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

В редких случаях возможно появление кожных аллергических реакций (зуд, высыпания).

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств.

Особые указания

При применении гомеопатических лекарств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

При температуре не ниже 0 и не выше 25 0С. Хранить в недоступном для детей месте.