Инструкция по применению
Резалют про капсулы 300 мг 100 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Германия
Производитель: Berlin-Chemie
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фосфолипиды
Количество в упаковке: 100
Дозировка действующего вещества: 600 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Фосфолипиды

Состав

1 капсула содержит:Активное вещество: Липоид PPL 600 600 мг, состоящий из: фосфолипиды полиненасыщенные из соевого лецитина 300 мг, глицерола моно /диалконат (C14-C18) 120 мг, триглицериды средней цепи 40.5 мг, масло соевое очищенное 138.5 мг, α-токоферол 1.0 мг.Вспомогательные вещества: масло соевое очищенное.Состав оболочки капсулы: желатин, глицерол 85%.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Исследования фармакокинетики фосфатидилхолина показали, что он распадается в кишечнике до лизо-фосфатидилхолина и всасывается, преимущественно, в этой же форме. В стенке кишки частично происходит его ресинтез до фосфолипида, который затем по лимфатическим сосудам попадает в циркуляторное русло, часть лизо-фосфатидилхолина распадается в печени до жирных кислот, холина и глицерин-3-фосфата. В плазме фосфатидилхолин и другие фосфоглицериды прочно связываются с липопротеинами и/или альбумином. Большая часть введенных соевых фосфолипидов с высоким содержанием в них (3-sn-фосфатидил)- холина объединяется в виде метаболитов, с собственными фосфолипидами организма в течение нескольких часов. Их выведение соответствует экскреции собственных фосфолипидов организма или их метаболитов.

Показания

— жировая дегенерация печени различной этиологии;— хронические гепатиты;— токсические поражения печени;— цирроз печени;— гиперхолестеринемия, при неэффективности диеты и других немедикаментозных мер (физической активности и мероприятий по снижению массы тела).

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для приема внутрь.Если нет других указаний, следует принимать по 2 капс. препарата Резалют Про 3 раза/сут перед едой, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости.Продолжительность курса лечения зависит от течения заболевания.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к фосфолипидам, арахису, сое и другим компонентам препарата;— антифосфолипидный синдром.С осторожностью: детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные о безопасности применения препарата при беременности отсутствуют. Поэтому применять Резалют Про следует только в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода.Данных о проникновении препарата Резалют Про в грудное молоко нет, поэтому при необходимости применения препарата Резалют Про в период лактации грудное вскармливание на период приема препарата следует прекратить.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: иногда может иметь место дискомфорт в эпигастральной области, диарея.Аллергические реакции: в редких случаях кожная сыпь, крапивница.Со стороны системы кроветворения: крайне редко – петехиальные высыпания, кровотечения у женщин в межменструальный период.

Передозировка

Сообщений о передозировке и интоксикации препаратом до настоящего времени не поступало.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи несовместимости до настоящего времени не известны.Однако нельзя исключать взаимодействие препарата Резалют Про с кумариновыми антикоагулянтами (например, фенпрокумоном, варфарином). В случае неизбежности соответствующей комбинированной терапии может возникнуть необходимость в коррекции дозы лекарственного препарата.

Особые указания

В одной капсуле препарата Резалют Про содержится менее 0.1 ХЕ.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиНе известно.

Условия хранения

Беречь от детей