Инструкция по применению
Резалют про капсулы 300 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Германия
Производитель: Berlin-Chemie
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фосфолипиды
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 600 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Фосфолипиды

Состав

Действующее вещество: Липоид PPL 600 - 600 мг состоящий из: фосфолипиды полиненасыщенные из соевого лецитина - 300,0 мг, глицерола моно/диалконат (C14-C18) - 120,0 мг, триглицериды средней цепи - 40,5 мг, масло соевое очищенное - 138,5 мг, а-токоферол - 1,0 мг;Вспомогательные вещества: масло соевое очищенное; Концентрация действующего вещества (мг): 300 мг

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Исследования фармакокинетики фосфатидилхолина показали, что он распадается в кишечнике до лизо-фосфатидилхолина и всасывается, преимущественно, в этой же форме. В стенке кишки частично происходит его ресинтез до фосфолипида, который затем по лимфатическим сосудам попадает в циркуляторное русло, часть лизо-фосфатидилхолина распадается в печени до жирных кислот, холина и глицерин-3-фосфата. В плазме фосфатидилхолин и другие фосфоглицериды прочно связываются с липопротеинами и/или альбумином. Большая часть введенных соевых фосфолипидов с высоким содержанием в них (3-sn-фосфатидил)- холина объединяется в виде метаболитов, с собственными фосфолипидами организма в течение нескольких часов. Их выведение соответствует экскреции собственных фосфолипидов организма или их метаболитов.

Показания

жировая дегенерация печени различной этиологии; хронические гепатиты; токсические поражения печени, цирроз печени;гиперхолестеринемия, при неэффективности диеты и других немедикаментозных мер (физической активности и мероприятий по снижению массы тела).

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для приема внутрь. Если нет других указаний, следует принимать по 2 капсулы Резалюта Про 3 раза в день перед едой, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости. Продолжительность курса лечения зависит от течения заболевания.

Противопоказания

повышенная чувствительность к фосфолипидам, арахису, сое и другим компонентам препарата;антифосфолипидный синдром.С осторожностью: детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данные о безопасности применения препарата при беременности отсутствуют. Поэтому применять Резалют Про следует только в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода.Данных о проникновении препарата Резалют Про в грудное молоко нет, поэтому при необходимости применения препарата Резалют Про в период лактации грудное вскармливание на период приема препарата следует прекратить.

Побочные действия

Со стороны желудочно-кишечного тракта: иногда может иметь место дискомфорт в эпигастральной области, диарея. Аллергические реакции: в редких случаях кожная сыпь, крапивница. Со стороны системы кроветворения: крайне редко - петехиальные высыпания, кровотечения у женщин в межменструальный период.

Передозировка

Сообщений о передозировке и интоксикации препаратом до настоящего времени не поступало

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи несовместимости до настоящего времени не известны.Однако нельзя исключать взаимодействие препарата Резалют Про с кумариновыми антикоагулянтами (например, фенпрокумоном, варфарином). В случае неизбежности соответствующей комбинированной терапии может возникнуть необходимость в коррекции дозы лекарственного препарата.

Особые указания

В одной капсуле препарата Резалют Про содержится менее 0.1 ХЕ.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиНе известно.

Условия хранения

В сухом месте