# Инструкция по применению
# Рибоксин буфус Раствор для внутривенного введения 20 мг/мл 10 мл 10 шт

## Характеристики




Форма выпуска: Раствор для инъекций
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Инозин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 2%

## Описание

Прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость.

## Действующее вещество

Инозин

## Состав

1 мл раствора содержит:Действующее вещество:инозин (рибоксин) – 20 мгвспомогательные вещества:метенамин (гексаметилентетрамин) – 2 мгнатрия гидроксид (1 М раствор натрия гидроксида) до pH 7,8 – 8,6вода для инъекций – до 1 мл

## Форма выпуска

Раствор для инъекций

## Фармакокинетика

Метаболизируется в печени с образованием глюкуроновой кислоты и последующим её окислением. В незначительном количестве выделяется с мочой.

**Показания**

Комплексное лечение перенесенного инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца, нарушений сердечного ритма, обусловленных применением сердечных гликозидов, на фоне миокардиодистрофии после перенесенных инфекционных заболеваний. Заболевания печени (гепатиты, цирроз, жировая дистрофия), урокопропорфирия. Операции на изолированной почке (в качестве средства фармакологической защиты при выключении кровообращения).

**Способ применения и дозы**

Препарат применяют внутривенно струйно медленно или капельно (40 – 60 капель в 1 минуту). Лечение начинают с введения 200 мг (10 мл 2 % раствора) 1 раз в день, затем, при хорошей переносимости, дозу увеличивают до 400 мг (20 мл 2 % раствора) 1 – 2 раза в день. Продолжительность лечения 10 – 15 дней.Струйное введение препарата возможно при острых нарушениях ритма сердца в разовой дозе 200 – 400 мг (10 – 20 мл 2 % раствора).Для фармакологической защиты почек, подвергнутых ишемии, рибоксин вводят внутривенно струйно в разовой дозе 1200 мг (60 мл 2 % раствора) за 5 – 15 минут до пережатия почечной артерии, а затем еще 800 мг (40 мл 2 % раствора) тотчас после восстановления кровообращения.При капельном введении в вену 2 % раствор препарата разводят в 5 % растворе декстрозы (глюкозы) или изотоническом растворе натрия хлорида (до 250 мл).

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к препарату, подагра, гиперурикемия, беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Противопоказано применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания.

**Побочные действия**

Аллергические реакции: кожный зуд, гиперемия кожи, крапивница (препарат следует отменить).Редко: повышение концентрации мочевой кислоты в крови, обострение подагры (при длительном применении).

**Передозировка**

Данные отсутствуют

**Взаимодействие с другими препаратами**

В настоящее время не выявлено.

**Особые указания**

Рибоксин не применяется для экстренной коррекции нарушений деятельности сердца. При почечной недостаточности применение препарата возможно лишь в случае, если (по мнению врача) ожидаемый положительный эффект преобладает над возможным риском от применения Во время длительного лечения следует контролировать концентрацию мочевой кислоты в крови и моче. При появлении кожного зуда и гиперемии кожи лечение препаратом следует отменить.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.