# Инструкция по применению
# Рибоксин ТХФЗ Таблетки 200 мг 50 шт




## Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Тюменский ХФЗ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Инозин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 200 мг
Срок годности: 2

## Описание

Препарат, нормализующий метаболизм миокарда, уменьшающий гипоксию тканей

## Действующее вещество

Инозин

## Состав

Инозин

## Форма выпуска

Таблетки

## Фармакокинетика

Инозин хорошо абсорбируется из ЖКТ. Метаболизируется в печени с образованием глюкуроновой кислоты и последующим ее окислением. В незначительном количестве выделяется почками.

**Показания**

ИБС, миокардиодистрофия, состояние после инфаркта миокарда, врожденные и приобретенные пороки сердца, нарушения ритма сердца, особенно при гликозидной интоксикации, миокардит, дистрофические изменения миокарда после тяжелых физических нагрузок и перенесенных инфекционных заболеваний или вследствие эндокринных нарушений, гепатиты, цирроз печени, жировая дистрофия печени, в т.ч. вызванные алкоголем или лекарственными средствами, профилактика лейкопении при радиоактивном облучении, операции на изолированной почке (как средство фармакологической защиты при временном отсутствии кровообращения в оперируемом органе).

**Способ применения и дозы**

При приеме внутрь начальная суточная доза составляет 600-800 мг, затем дозу постепенно увеличивают до 2.4 г/сут в 3-4 приема. При в/в (струйно или капельно) введении начальная доза составляет 200 мг 1 раз/сут, затем дозу увеличивают до 400 мг 1-2 раза/сут. Продолжительность курсового лечения устанавливается индивидуально.

**Противопоказания**

Подагра, гиперурикемия, повышенная чувствительность к инозину.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Допустимо

**Побочные действия**

Возможно: зуд, гиперемия кожи.

**Особые указания**

С осторожностью назначают инозин при нарушениях функции почек. При появлении зуда и гиперемии кожи инозин следует отменить.

**Условия хранения**

Беречь от детей. При комнатной температуре.