Инструкция по применению
Рибомунил таблетки 750мг N4

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Франция
Производитель: Pierre Fabre
Порядок отпуска: по рецепту
Количество в упаковке: 4
Дозировка действующего вещества: 750 мг



Описание

Таблетки Рибомунил (рибосомально-протеогликановый комплекс) - препарат базисной иммунотерапии. Назначается для профилактики и лечения рецидивирующих инфекций уха, горла, носа и дыхательных путей. При этом снижается частота, тяжесть и продолжительность эпизодов инфекций, а также необходимость в назначении интенсивной антибиотикотерапии, ГКС.

Состав

Бактериальные рибосомы, титрованные до 70% РНК (включая рибосомы Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae), протеогликаны мембранной части (включая Klebsiella pneumoniae, кремний, стеарат магния, сорбитол.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Профилактика рецидивирующих инфекций органов дыхания и ЛОР-органов — отита, синусита, ринита, фарингита, ларингита, тонзиллита, трахеита, бронхита, пневмонии у детей.

Способ применения и дозы

Внутрь, 1 раз в сутки, утром, натощак. Разовая доза (вне зависимости от возраста) составляет 1 табл. по 0,75 мг. В первый месяц лечения и/или с профилактической целью Рибомунил принимают ежедневно 4 дня в неделю в течение 3 нед, в последующие 5 мес — первые 4 дня каждого месяца.

Противопоказания

Гипрчувствительность, аутоимунные заболевания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение при беременности и в период грудного вскармливания, если ожидаемый эффект терапии превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Преходящая гиперсаливация (в начале лечения), аллергические реакции (крапивница, ангионевротический отек), тошнота, рвота, диарея.

Взаимодействие с другими препаратами

Можно сочетать с другими лекарственными препаратами (антибиотики, бронхолитики, противовоспалительные средства).

Особые указания

Возможно транзиторное повышение температуры тела на 2–3 сутки, что является проявлением терапевтического эффекта препарата и не требует, как правило, прекращения лечения. Иногда сопровождается незначительными и преходящими симптомами инфекций лор-органов.