Инструкция по применению
Ригевидон 21+7 таблетки 84 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Венгрия
Производитель: Гедеон Рихтер
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Левоноргестрел+Этинилэстрадиол
Количество в упаковке: 84
Дозировка действующего вещества: 0,15 мг+ 0,03 мг

Описание

Таблетки Ригевидон - пероральный контрацептив, его применение дает возможность предупредить нежелательную беременность. Такое действие препарата реализуется за счет подавления овуляции, повышения вязкости цервикальной слизи, изменения структуры эндометрия. Способность к оплодотворению полностью восстанавливается через 1-3 цикла после отмены Ригевидона.

Действующее вещество

Левоноргестрел+Этинилэстрадиол

Состав

Этинилэстрадиол, левоноргестрел, диоксид кремния коллоидный, стеарат магния, тальк, кукурузный крахмал, моногидрат лактозы, Оболочка: сахароза, тальк, карбонат кальция, диоксид титана, коповидон, макрогол 6000, диоксид кремния коллоидный, повидон, кармеллоза натрия.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Этинилэстрадиол быстро и почти полностью абсорбируется из кишечника. Метаболизируется в печени и кишечнике. Метаболиты этинилэстрадиола - водорастворимые сульфатные или глюкуронидные конъюгаты, поступают в кишечник с желчью, где подвергаются дезинтеграции с помощью кишечных бактерий. Метаболизируется в печени, Т1/2 составляет 2-7 ч. Этинилэстрадиол выводится почками (40%) и через кишечник (60%).Левоноргестрел быстро абсорбируется (менее, чем за 4 ч). При совместном применении левоноргестрела с этинилэстрадиолом существует зависимость между дозой и максимальной концентрацией в плазме. Большая часть левоноргестрела связывается в крови с альбумином и ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны). Метаболизируется в печени. Левоноргестрел выводится почками (60%) и через кишечник (40%).

Показания

Пероральная контрацепция, функциональные нарушения менструального цикла (в т.ч. дисменорея без органической причины, дисфункциональная метроррагия, предменструальный синдром).

Способ применения и дозы

Внутрь, не разжевывая и запивая небольшим количеством жидкости.К контрацепции препаратом Ригевидон приступают с 1-го дня менструации, принимая ежедневно по 1 таблетке в течение 21-го дня, в одно и то же время суток. Затем следует 7-дневный перерыв, во время которого наступает менструальноподобное кровотечение. Следующий 21-дневный цикл приема таблеток из новой упаковки, содержащей 21 табл., необходимо начинать на следующий день после 7-дневного перерыва, т.е. на 8-й день, даже в том случае, если кровотечение не прекратилось. Таким образом, начало приема препарата из каждой новой упаковки приходится на один и тот же день недели.Пропущенную таблетку следует принять в течение ближайших 12 ч. Если с момента приема последней таблетки прошло 36 ч, контрацепция ненадежна. Во избежание межменструальных кровянистых выделений прием препарата необходимо продолжать из уже начатой упаковки, за исключением пропущенной таблетки. В случаях пропуска таблеток рекомендуется дополнительно применять другой, негормональный способ контрацепции (например барьерный).В лечебных целях доза препарата Ригевидон и схема применения подбираются врачом в каждом случае индивидуально.

Противопоказания

Тяжелые заболевания печени, врожденные гипербилирубинемии, холецистит, наличие или указание в анамнезе на тяжелые сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания, тромбоэмболии и предрасположенность к ним, злокачественные опухоли (прежде всего рак молочной железы или эндометрия), опухоли печени, семейные формы гиперлипидемии, тяжелые формы артериальной гипертензии, эндокринные заболевания (в т.ч. тяжелые формы сахарного диабета), серповидно-клеточная анемия, хроническая гемолитическая анемия, влагалищное кровотечение неизвестной этиологии, пузырный занос, мигрень, отосклероз, идиопатическая желтуха беременных в анамнезе, тяжелый кожный зуд беременных, герпес беременных, возраст старше 40 лет, повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано

Побочные действия

Возможные побочные эффекты транзиторного характера, спонтанно проходящие: тошнота, рвота, головная боль, нагрубание молочных желез, изменение массы тела и либидо, изменение настроения, ациклические кровянистые выделения.При длительном приеме очень редко могут возникать хлоазма, снижение слуха, генерализованный зуд, желтуха, судороги икроножных мышц, увеличение частоты эпилептических припадков.

Взаимодействие с другими препаратами

Снижение контрацептивного эффекта при одновременном приеме с барбитуратами, некоторыми противоэпилептическими препаратами (карбамазепин, фенитоин), сульфаниламидами, производными пиразолона. Аналогичный эффект при одновременном назначении с некоторыми противомикробными средствами (в т.ч. с ампициллином, рифампицином, хлорамфениколом, неомицином, полимиксином В, сульфаниламидами, тетрациклинами).При одновременном применении с антикоагулянтами, производными кумарина или индандиона может потребоваться дополнительное определение протромбинового индекса и изменение дозы антикоагулянта.При применении трициклических антидепрессантов, мапротилина, бета-адреноблокаторов возможно увеличение их биодоступности и токсичности.При применении пероральных гипогликемических препаратов и инсулина возможно появление необходимости в изменении их дозы.При сочетании с бромокриптином снижается его эффективность.При сочетании с препаратами с потенциальным гепатотоксическим действием, например, с препаратом дантролен, наблюдается усиление гепатотоксичности, особенно у женщин старше 35 лет.

Особые указания

У курящих женщин, принимающих гормональные контрацептивы, имеется повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний с серьезными последствиями (инфаркт миокарда, инсульт). Риск увеличивается с возрастом и в зависимости от количества выкуриваемых сигарет (особенно у женщин старше 35 лет).