# Инструкция по применению
# Римекор таблетки покрытые оболочкой 20мг N30

## Характеристики




Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Триметазидин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 20 мг

## Действующее вещество

Триметазидин

## Состав

Триметазидина дигидрохлорид 20 мг. Вспомогательные вещества: лудипресс ЛЦЕ - 37 мг (лактозы моногидрат 94.7-98.3%, повидон - 3-4%), лактозы моногидрат - 37 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 3 мг, кроскармеллоза натрия - 2 мг, магния стеарат - 1 мг. Состав пленочной оболочки: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) - 3.306 мг, титана диоксид - 0.716 мг, тальк - 0.254 мг, макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000) - 0.716 мг, краситель азорубин (Е122) - 0.008 мг.

## Форма выпуска

Таблетки

**Фармакокинетика**

Всасывание: После приема препарата внутрь триметазидин быстро и практически полностью абсорбируется из ЖКТ. Биодоступность - 90%. Время достижения Cmax в плазме крови - 2 ч. После однократного приема триметазидина в дозе 20 мг Cmax в плазме крови составляет около 55 нг/мл. Распределение: Связывание с белками плазмы - 16%. Легко проникает через гистогематические барьеры. Выведение: T1/2 составляет 4.5-5 ч. Выводится из организма почками (около 60% - в неизмененном виде).

**Показания**

— ИБС: профилактика приступов стенокардии (в составе комплексной терапии)— хориоретинальные сосудистые нарушения— головокружения сосудистого происхождения— кохлео-вестибулярные нарушения ишемической природы (шум в ушах, нарушение слуха).

**Способ применения и дозы**

Препарат принимают внутрь, во время еды. Рекомендуемая доза составляет 40-60 мг /сут (2-3 таб.) в 2-3 приема. Продолжительность курса терапии определяется индивидуально.

**Противопоказания**

— почечная недостаточность (КК < 15 мл/мин) — выраженные нарушения функции печени— беременность— период лактации (грудного вскармливания)— детский и подростковый возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены)— повышенная чувствительность к компонентам препарата.