Инструкция по применению
РиниКолд бронхо Сироп 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Индия
Производитель: Шрея
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Амброксол+Хлорфенамина малеат+Фенилэфрина гидрохлорид+Гвайфенезин
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Амброксол+Хлорфенамина малеат+Фенилэфрина гидрохлорид+Гвайфенезин

Состав

10 мл сиропа содержит:Активные вещества: амброксола гидрохлорид 15 мг; хлорфенамина малеат 2 мг; фенилэфрина гидрохлорид 5 мг; гвайфенезин 100 мг; Вспомогательные вещества: сахароза — 4000 мг; метилпарагидроксибензоат — 18 мг; пропилпарагидроксибензоат — 2 мг; динатрия эдетат — 2 мг; сорбитол 70% раствор — 1000 мг; глицерин (глицерол) — 500 мг; ментол — 1 мг, лимонная кислота — 2 мг; натрия цитрат — 5 мг; ароматизатор дыни — 0,03 мл; краситель "Солнечный закат" желтый (Е110) — 0,66 мг; вода очищенная — q.s. до 10 мл.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Симптоматическое лечение "простудных" заболеваний, гриппа и ОРВИ, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой вязкой мокротой.

Способ применения и дозы

Внутрь. Перед применением взбалтывать! Рекомендуемая доза для взрослых и детей старше 12 лет — 20 мл (4 ч.ложки) 3 раза в день. Рекомендуемая доза для детей 6–12 лет — 10 мл (2 ч.ложки) 2–3 раза в день. Прием препарата следует равномерно распределить в течение всего дня.

Противопоказания

Гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата, одновременный прием других препаратов, содержащих вещества, входящие в состав Риниколд Бронхо, одновременный прием трициклических антидепрессантов, ингибиторов МАО, бета-адреноблокаторов, судороги любой этиологии, выраженный атеросклероз коронарных артерий, артериальная гипертензия, сахарный диабет, тиреотоксикоз, феохромоцитома, закрытоугольная глаукома, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, аденома предстательной железы, дефицит фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, беременность, период лактации, детский возраст (до 6 лет).

Побочные действия

Препарат усиливает действие седативных средств, этанола. Совместное применение с антидепрессантами, производными фенотиазина (хлорпромазин, трифлуоперазин, левомепромазин), противопаркинсоническими и антипсихотическими средствами повышает риск развития задержки мочи, сухости во рту, запоров. При одновременном применении с ГКС (преднизолон, дексаметазон, триамцинолон) повышается риск развития глаукомы. Хлорфенамин при применении одновременно с ингибиторами МАО (ниаламид), фуразолидоном может привести к гипертоническому кризу, возбуждению, гиперпирексии. Применение совместно с трициклическими антидепрессантами усиливается симпатомиметическое действие, с галотаном - повышается риск развития желудочковой аритмии, с гуанетидином - снижается его гипотензивное действие. Гуанетидин, в свою очередь, усиливает альфа-адреностимулирующую активность фенилэфрина, входящего в состав препарата. Одновременное применение амброксола и гвайфенезина с противокашлевыми средствами приводит к затруднению отхождения мокроты.

Взаимодействие с другими препаратами

Меры предосторожности

Особые указания

Со стороны сердечно-сосудистой системы: возможны подъем АД, тахикардия. Со стороны ЦНС: головная боль, сонливость, головокружение, повышенная возбудимость, нарушение засыпания. У детей возможны возбуждение, беспокойство, раздражительность. У пациентов пожилого возраста возможны также спутанность сознания, раздражительность.Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, запор, диарея, боли в эпигастральной области.Со стороны органа зрения: мидриаз, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления.Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, отек Квинке. Прочие: сухость слизистых оболочек, затруднение мочеиспускания.