Инструкция по применению
РИНИКОЛД ТАБЛ. N10

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Индия
Производитель: Шрея
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Кофеин+Парацетамол+Фенилэфрин+Фенирамин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 30 мг+ 500 мг+ 10 мг+ 2 мг
Срок годности: 36

Действующее вещество

Кофеин+Парацетамол+Фенилэфрин+Фенирамин

Состав

Парацетамол 500 мг, кофеин 30 мг, фенилэфрина гидрохлорид 10 мг, хлорфенамина малеат.; Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал, магния стеарат, тальк, натрия крахмала гликолат, желатин, поливинилпирролидон, метилпарабен, пропилпарабен.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Риниколд не предоставлены.

Показания

— простудные заболевания, сопровождающиеся ринитом, заложенностью носа, головной болью, лихорадкой, ознобом, болью в суставах, мышцах.

Способ применения и дозы

Препарат назначают внутрь.; Взрослым - по 1-2 таб. каждые 4-6 ч. Максимальная суточная доза - 8 таб.; Детям старше 6 лет - по 1 таб. каждые 4-6 ч, но не более 4 раз /сут в течение не более 5 дней.

Противопоказания

— беременность; — период лактации (грудное вскармливание); — детский возраст до 6 лет; — одновременный прием трициклических антидепрессантов, ингибиторов МАО, бета-адреноблокаторов; — одновременный прием других препаратов, содержащих активные вещества, входящие в состав Риниколда; — повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Со стороны ЦНС: головокружение, нарушения сна, повышенная возбудимость, головная боль.; Со стороны пищеварительной системы: тошнота, сухость во рту.; Прочие: аллергические реакции.; При приеме препарата в рекомендуемых дозах побочные эффекты возникают редко.

Передозировка

Симптомы обусловлены главным образом действием парацетамола: возможны бледность кожных покровов, анорексия, тошнота, рвота, гепатонекроз, повышение активности печеночных трансаминаз, увеличение протромбинового времени.; Лечение: промывание желудка с последующим назначением активированного угля, симптоматическая терапия.; Пациента следует предупредить о необходимости обратиться к врачу в случае передозировки.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат усиливает действие седативных средств, этанола.; Совместное применение с антидепрессантами, противопаркинсоническими средствами, антипсихотическими средствами, производными фенотиазина (хлорпромазин, трифлуоперазин, левомепромазин) повышает риск развития задержки мочи, сухости во рту, запоров.; При одновременном применении с ГКС повышается риск развития глаукомы.; Хлорфенамин при применении одновременно с ингибиторами МАО, фуразолидоном может привести к гипертоническому кризу, возбуждению.; Трициклические антидепрессанты усиливают симпатомиметическое действие препарата, одновременное назначение галотана повышает риск развития желудочковой аритмии. Снижает гипотензивное действие гуанетидина, который, в свою очередь, усиливает альфа-адреностимулирующую активность фенилэфрина.

Особые указания

В период лечения следует воздержаться от приема алкоголя.; Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами;С осторожностью следует применять у пациентов, которые выполняют работу, требующую повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом темном месте