Инструкция по применению
Ринонорм Комфорт Спрей назальный дозированный 0,1 мг + 5 мг/доза 10 мл

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Германия
Производитель: ТЕВА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ксилометазолин+Декспантенол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,1 мг+ 5 мг /доза

Описание

Прозрачный почти бесцветный раствор.

Действующее вещество

Ксилометазолин+Декспантенол

Состав

1 доза препарата содержит: действующие вещества: ксилометазолина гидрохлорид 0,100/ 0,050 мг, декспантенол 5,000 мг, вспомогательные вещества: натрия гидрофосфата гептагидрат (динатрия фосфат гептагидрат) 0,0225 мг, калия дигидрофосфат 0,855 мг, вода для инъекций 95,322/ 95,372 мг.

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

Ксилометазолин при местном применении практически не абсорбируется, концентрации в плазме крови настолько низки, что их определение современными аналитическими методами невозможно. Декспантенол при местном применении быстро абсорбируется слизистой оболочкой, превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы крови (главным образом, с бета-глобулином и альбумином). Ее концентрация в крови – 0,5-1 мг/л, в сыворотке крови – 100 мкг/л. Пантотеновая кислота не подвергается метаболизму (кроме включения в Ко-А), выводится в неизменном виде.

Показания

Применяют при острых респираторных заболеваниях с явлениями ринита, остром аллергическом рините, вазомоторном рините, синуситах, при среднем отите (в составе комбинированной терапии для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки), для облегчения проведения риноскопии, восстановления нарушенного носового дыхания после хирургических вмешательств в полости носа.

Способ применения и дозы

Интраназально. Для дозировки 0,1 мг + 5 мг/доза – взрослым и детям от 6 лет одно впрыскивание в каждый носовой ход 3-4 раза в день. Продолжительность терапии 5-7 дней. Для дозировки 0,05 мг + 5 мг/доза – детям от 2 до 6 лет одно впрыскивание в каждый носовой ход 3-4 раза в день. Продолжительность терапии 5-7 дней. Не следует применять более 7 дней. Продолжительность применения препарата у детей устанавливается после консультации с врачом. Повторное применение возможно только после перерыва в несколько дней. Если через 5 дней лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. Способ применения Снимите защитный колпачок, Перед первым применением несколько раз нажмите на помповое дозирующее устройство до появления равномерного распыления, Держите флакон в вертикальном положении, вставьте наконечник дозирующего устройства в носовой ход и нажмите один раз. Во время впрыскивания нужно легко вдохнуть носом, После применения тщательно протрите наконечник дозирующего устройства чистой салфеткой и закройте защитный колпачок.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, атрофический ринит, сухой ринит, гипертиреоз, порфирия, гиперплазия предстательной железы, глаукома, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе), одновременное применение с ингибиторами моноаминооксидазы (МАО) и трициклическими антидепрессантами, беременность, период грудного вскармливания. Для дозировки 0.1 мг + 5 мг/доза Детский возраст до 6 лет Для дозировки 0.05 мг + 5 мг/доза Детский возраст до 2 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не должен применяться при беременности. Применение препарата в период грудного вскармливания следует избегать.

Побочные действия

Перечисленные ниже нежелательные явления систематизированы в соответствии с Классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 и <1/10), нечасто (≥1/1000 и <1/100), редко (≥1/10000 и <1/1000), очень редко (<1/10000), неизвестно (невозможно определить на основе имеющихся данных). Со стороны иммунной системы: очень редко – аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, ангионевротический отек). Со стороны нервной системы: очень редко – головная боль, беспокойство, бессонница, усталость (сонливость), галлюцинации (преимущественно у детей). Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко – ощущение сердцебиения, тахикардия, повышение артериального давления, очень редко – аритмия. Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: очень редко – отек слизистой оболочки носа, гиперсекреция, кровотечения из носа, частота неизвестна – жжение и сухость слизистой оболочки носа, чихание. Со стороны костно-мышечной системы: очень редко – судороги (преимущественно у детей). Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

В случаях передозировки или случайного перорального применения могут возникнуть следующие симптомы: мидриаз, тошнота, рвота, цианоз, лихорадка, судороги, тахикардия, нарушение ритма сердца, сосудистая недостаточность, остановка сердца, гипертензия, отек легких, нарушение функции дыхания, галлюцинации. У пациентов также могут появиться симптомы угнетения со стороны центральной нервной системы, сопровождающиеся сонливостью, снижением температуры тела, брадикардией, шоком, остановкой дыхания и комой. Лечение: применение активированного угля, промывание желудка, кислородная вентиляция легких. Для снижения артериального давления назначают 5 мг фентоламина в 0,9% растворе натрия хлорида путем медленного внутривенного введения или 100 мг фентоламина перорально. Сосудосуживающие препараты противопоказаны. При необходимости применяют жаропонижающие и противосудорожные средства.

Взаимодействие с другими препаратами

Сопутствующее применение ингибиторов МАО и трициклических антидепрессантов может привести к повышению артериального давления вследствие воздействия этих препаратов на сердечно-сосудистую систему.

Особые указания

Перед применением необходимо очистить носовые ходы. Продолжительность применения препарата у детей устанавливается после консультации с врачом. Пациенты с синдромом удлинённого интервала QT, применяющие ксилометазолин, могут быть подвержены повышенному риску развития серьезных желудочковых аритмий. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами При применении препарата в соответствии с данной инструкцией по применению препарат не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами, однако при появлении нежелательных явлений следует воздержаться от выполнения указанных видов деятельности.

Срок хранения после открытия

3 года. После вскрытия флакона препарат пригоден для применения в течение 6 месяцев. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (флакон в пачке). Хранить в недоступном для детей месте!