Инструкция по применению
Ринофлуимуцил Спрей назальный 10 мл

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Италия
Производитель: Zambon
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ацетилцистеин+Туаминогептан
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 10 мг+5 мг/1 мл

Описание

Практически бесцветная прозрачная жидкость с характерным мятным слегка сернистым запахом.

Действующее вещество

Ацетилцистеин+Туаминогептан

Состав

100 мл раствора содержат активные вещества: ацетилцистеин - 1,0 г, туаминогептана сульфат - 0,5 г, вспомогательные вещества: бензалкония хлорид 0,01 г, гипромеллоза 0,75 г, динатрия эдетат 0,02 г, натрия дигидрофосфат 0,3 г, натрия гидрофосфат додекагидрат 0,3 г, дитиотреитол 0,1 г, сорбитол 70% 2,0 г, ароматизатор мятный 0,0188 г, этанол 96% 0,31 г, натрия гидроксид 0,36 г, вода очищенная до 100 мл.

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

При местном применении в рекомендованных дозах препарат не абсорбируется.

Показания

Острый и подострый ринит с густым гнойно-слизистым секретом, хронический ринит, вазомоторный ринит, синусит.

Способ применения и дозы

Препарат вводят в носовую полость в виде спрея с помощью специального распылителя. Взрослым: по 2 дозы спрея (2 нажатия на клапан) в каждый носовой ход 3-4 раза в день. Детям старше 6 лет: по 1 дозе спрея (1 нажатие на клапан) в каждый носовой ход 3-4 раза в день. Длительность лечения не должна превышать 7 дней. Не следует превышать рекомендованные дозы и курс лечения без консультации с врачом.

Противопоказания

* Гиперчувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ. * Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертония. * Цереброваскулярные заболевания в анамнезе, в том числе наличие соответствующих факторов риска (ввиду альфа-симпатомиметической активности). * Судороги в анамнезе. * Феохромоцитома. * Закрытоугольная глаукома. * Одновременный прием других симпатомиметических назальных средств, в том числе других средств против заложенности носа. * Пациенты, которые получают в настоящее время или получали на протяжении 2 недель ингибиторы моноаминоксидазы, включая обратимые ингибиторы моноаминоксидазы А (RIMA). * Гипофизэктомия или операция с обнажением твердой мозговой оболочки. * Дети в возрасте до 6 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или младенца.

Побочные действия

В редких случаях возможны: аллергические реакции, возбуждение, сердцебиение, тахикардия, тремор, артериальная гипертензия, задержка мочеиспускания, сухость слизистой оболочки полости носа, рта и глотки, воспаление сальных желез. Длительный прием лекарственных средств, содержащих сосудосуживающие вещества, может изменить нормальную функцию слизистой оболочки носа и придаточных пазух носа, а также вызвать привыкание к препарату.

Передозировка

При передозировке у взрослых пациентов могут наблюдаться следующие симптомы: артериальная гипертензия, светобоязнь, сильная головная боль, стеснение в грудной клетке. При передозировке у детей возможна гипотермия с выраженным седативным эффектом. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

* Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО), включая обратимые ингибиторы моноаминоксидазы (оИМАО): повышение риска возникновения гипертонического криза; * Антигипертензивные средства (включая блокаторы адренергических нейронов или бета-блокаторы): может блокировать гипотензивное действие препаратов; * Сердечные гликозиды: может повышать риск возникновения сердечной аритмии; * Алкалоиды спорыньи: может повышать риск возникновения эрготизма; * Препараты для лечения болезни Паркинсона: может повышать риск токсического действия на сердечно-сосудистую систему; * Окситоцин: может повышать риск возникновения гипертензии;

Особые указания

Только для назального применения. Ринофлуимуцил® не оказывает влияния на возможность управления транспортными средствами и другими механизмами.

Срок хранения после открытия

20 дней

Условия хранения

При температуре от 15 до 25 °C. Хранить в местах, недоступных для детей