
Инструкция по применению
Ринонорм Спрей 0,05 % 20 мл

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Германия
Производитель: Меркле ГмбХ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ксилометазолин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,05%

Описание

Прозрачный почти бесцветный раствор.

Действующее вещество

Ксилометазолин

Состав

1 доза препарата содержит:действующее вещество: ксилометазолина гидрохлорид 0,035 мгвспомогательные вещества: бензалкония хлорид (в виде 50% раствора) 0,028 мг в пересчете на бензалкония хлорид 0,014 мг, лимонной кислоты моногидрат 0,035 мг, натрия цитрат дигидрат 0,182 мг, глицерол 85 % 1,680 мг, вода очищенная до 68,390 мг.

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

При местном применении ксилометазолин практически не абсорбируется, поэтому концентрации в плазме крови очень малы (аналитически не определяются).

Показания

В качестве симптоматического лечения при следующих заболеваниях и состояниях: острый вирусный или бактериальный ринит:острый аллергический ринит:острый синусит или обострение хронического синусита:острый средний отит (для уменьшения отека слизистой оболочки евстахиевой трубы):подготовка больных к диагностическим процедурам в носовых ходах.

Способ применения и дозы

Детям от 2-х до 10 лет: по 1 дозе (одно нажатие на поршневое устройство) в каждый носовой ход не более 3-х раз в день (максимальная доза не должна превышать 7 раз в день). Интервал между введением препарата не должен быть менее 6 часов. 1 доза = 0,07 мл раствора, 35 мкг. Во избежание осложнений в виде возобновления симптомов заболевания, продолжительность непрерывного применения препарата не должна превышать 7 дней. Перед применением препарата рекомендуется освободить носовой ход от секрета, а во время введения препарата необходимо сделать легкий вдох через нос.

Противопоказания

повышенная чувствительность к ксилометазолину или другим компонентам препаратавоспаление кожи, слизистой оболочки носа и образование корки (сухой ринит)применение после гипофизэктомииприменение у детей до 2 летзакрытоугольная глаукомаприем ингибиторов моноаминоксидазы (МАО) и трициклических антидепрессантов.

Побочные действия

Ощущение жжения и сухости слизистой оболочки полости носа; в редких случаях – раздражение слизистой оболочки носа, ротовой полости и гортани, головная боль и тошнота; крайне редко (< 1/10000) – аритмия, увеличение артериального давления, повышенная возбудимость, кожные реакции.

Передозировка

В редких случаях передозировки, возникающих преимущественно у детей, могут наблюдаться следующие симптомы: нерегулярный пульс, повышение артериального давления, в некоторых случаях – потеря сознания. При передозировке показано симптоматическое лечение под наблюдением. В серьёзных случаях могут быть применены неселективные альфа-адреноблокаторы для снижения артериального давления, а также интубация и искусственная вентиляция лёгких. Сосудосуживающие препараты противопоказаны. При случайном приёме умеренного или большого количества препарата внутрь, следует принять активированный уголь (адсорбент) и натрия сульфат (слабительное средство), сделать промывание желудка.