Инструкция по применению
Ринонорм Спрей назальный 0,1 % 20 мл

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Чехия
Производитель: Меркле ГмбХ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ксилометазолин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,1%

Описание

Прозрачный почти бесцветный раствор.

Действующее вещество

Ксилометазолин

Состав

1 доза препарата содержит:Действующее вещество: ксилометазолина гидрохлорид 0,14 мгВспомогательные вещества: бензалкония хлорид (в виде 50% раствора) 0,056 мг в пересчете на бензалкония хлорид 0,028 мг, лимонной кислоты моногидрат 0,07 мг, натрия цитрат дигидрат 0,364 мг, глицерол 85% 3,36 мг, вода очищенная 136,71 мг.

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

При местном применении ксилометазолин практически не абсорбируется, поэтому концентрации в плазме крови очень малы (аналитически не определяются).

Показания

Острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка), острый аллергический ринит, поллиноз, синусит, евстахиит, средний отит (в составе комбинированной терапии для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки). Подготовка пациента к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

Способ применения и дозы

Интраназально. У детей старше 6 лет и взрослых по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход до 3-х раз в сутки. 1 доза соответствует 0,14 мл раствора и содержит 140 мкг действующего вещества. Не следует применять препарат более 3-х раз в сутки. Не рекомендуется применение лекарственного препарата более 5-7 дней. Препарат у детей следует применять под наблюдением взрослых. По поводу длительности применения у детей следует советоваться с врачом.

Противопоказания

гиперчувствительность к ксилометазолину или любому из вспомогательных веществ препаратаартериальная гипертензиятахикардиявыраженный атеросклерозглаукомагипертиреозатрофический ринитвоспалительные заболевания кожи или слизистой оболочки преддверия носахирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе)состояние после транссфеноидальной гипофизэктомииберемennостьприменение ингибиторов моноаминооксидазы (МАО) (включая 14 дней после их отмены), трициклических или тетрациклических антидепрессантовдетский возраст до 6 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не следует принимать во время беременности. Принимать с осторожностью во время грудного вскармливания

Побочные действия

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), частота побочных эффектов распределяется следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10000 до <1/1000), очень редко (от <1/10000); частота неизвестна (по имеющимся данным установить частоту возникновения не представляется возможным). Со стороны иммунной системы: редко - аллергические реакции (ангионевротический отек, кожная сыпь, зуд). Со стороны нервной системы: редко - головная боль, головокружение, галлюцинации (преимущественно у детей), судороги (преимущественно у детей), депрессия (при длительном применении в высоких дозах); очень редко - беспокойство, бессонница, сонливость; частота неизвестна - усталость, парестезии. Со стороны органов чувств: очень редко - нарушение зрительного восприятия. Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко - ощущение сердцебиения, повышение артериального давления; очень редко - тахикардия, аритмия. Со стороны дыхательной системы: часто - раздражение и/или сухость слизистой оболочки носа, чихание, гиперсекреция слизистой оболочки носоглотки; нечасто - носовое кровотечение, ощущение покалывания или жжения в носу и горле; частота неизвестна - после применения препарата может наблюдаться усиление отека слизистой оболочки носа (реактивная гиперемия). Со стороны пищеварительной системы: очень редко - тошнота; частота неизвестна - рвота. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

В редких случаях передозировки, возникающих преимущественно у детей, могут наблюдаться следующие симптомы: нерегулярный пульс, повышение артериального давления, в некоторых случаях - потеря сознания. При передозировке показано симптоматическое лечение под наблюдением. В серьёзных случаях могут быть применены неселективные альфа-адреноблокаторы для снижения артериального давления, а также интубация и искусственная вентиляция лёгких. Сосудосуживающие препараты противопоказаны. При случайном приёме умеренного или большого количества препарата внутрь, следует принять активированный уголь (адсорбент) и натрия сульфат (слабительное средство), сделать промывание желудка.