Инструкция по применению
Ринорус спрей 0,1% 10мл

Характеристики

Форма выпуска: Спрей
Страна: Россия
Производитель: Биннофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ксилометазолин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1 мг/мл



Описание

Ринорус - спрей назальный 0.1% прозрачный, бесцветный или со слегка желтоватым оттенком, с запахом эвкалипта.

Действующее вещество

Ксилометазолин

Состав

ксилометазолина гидрохлорид 1 мгВспомогательные вещества: бензалкония хлорид - 0.1 мг, натрия хлорид - 5 мг, динатрия эдетат - 0.5 мг, натрия дигидрофосфата дигидрат - 6 мг, натрия гидрофосфата дигидрат - 3.5 мг, масло эвкалиптовое - 0.85 мг, вода д/и - до 1 мл.

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

При местном применении препарат практически не всасывается, поэтому его концентрация в плазме крови очень мала (современными аналитическими методами не определяется).

Показания

— острый ринит (в т.ч. на фоне острых респираторных заболеваний и аллергический ринит).— синусит.— евстахиит.— средний отит (в составе комбинированной терапии для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки).— для облегчения проведения риноскопии.— подготовка больных к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

Способ применения и дозы

Спрей назальныйВзрослым и детям старше 6 лет – по 1 впрыскиванию спрея назального 0.1% в каждый носовой ход 3 раза/сут. При необходимости можно повторить впрыскивание (не более двух впрыскиваний одновременно).Детям от 2 до 6 лет – по 1 впрыскиванию спрея назального 0.05% в каждый носовой ход 1-2 раза /сут.Не следует применять препарат более 3 раз/сут. Продолжительность лечения – не более 5-7 дней (без перерыва).После завершения терапии препарат можно назначать повторно только через несколько дней.Длительность применения препарата у детей определяет врач.

Противопоказания

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат Ринорус® в форме капель назальных противопоказан к применению при беременности.Препарат Ринорус® в форме спрея назального при беременности следует применять только после тщательной оценки соотношения пользы для матери и риска для плода, не допускается превышение рекомендуемых доз.В период грудного вскармливания препарат следует назначать с осторожностью.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно усиление системного действия ксилометазолина при одновременном применении ингибиторов МАО и трициклических антидепрессантов.

Условия хранения

В сухом прохладном месте. Беречь от детей. Не подвергать воздействию прямого солнечного света. При комнатной температуре