Инструкция по применению
Даксабрис Таблетки 15 мг 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Р-Фарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Ривароксабан
Количество в упаковке: 100
Дозировка действующего вещества: 15 мг



Описание

РИВАРОКСАБАН, 15 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой Препарат представляет собой таблетки круглые, двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой розового с коричневатым оттенком цвета. На поперечном разрезе ядро таблетки от белого до почти белого цвета. Характеристика препарата:Препарат РИВАРОКСАБАН содержит действующее вещество ривароксабан. Он относится к антитромботическим средствам, т.е. лекарственным препаратам, блокирующим образование сгустков крови (тромбов).

Действующее вещество

Ривароксабан

Состав

Препарат РИВАРОКСАБАН содержит: Действующим веществом является ривароксабан. РИВАРОКСАБАН, 15 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой Каждая таблетка 15 мг содержит 15 мг ривароксабана. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза микрокристаллическая тип 101, лактозы моногидрат, кроскармеллоза натрия, гипромеллоза, магния стеарат, натрия лаурилсульфат, поливиниловый спирт, титана диоксид, макрогол 4000, тальк, краситель железа оксид желтый, краситель железа оксид красный (см. раздел 2 листка-вкладыша, "Препарат РИВАРОКСАБАН содержит лактозы моногидрат" и "Препарат РИВАРОКСАБАН содержит натрий"), РИВАРОКСАБАН, 20 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой Каждая таблетка 20 мг содержит 20 мг ривароксабана. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза микрокристаллическая тип 101, лактозы моногидрат, кроскармеллоза натрия, гипромеллоза, магния стеарат, натрия лаурилсульфат, поливиниловый спирт, титана диоксид, макрогол 4000, тальк, краситель железа оксид желтый, краситель железа оксид красный (см. раздел 2 листка-вкладыша, "Препарат РИВАРОКСАБАН содержит лактозы моногидрат" и "Препарат РИВАРОКСАБАН содержит натрий").

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат РИВАРОКСАБАН показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет для: У детей и подростков в возрасте до 18 лет с массой тела 30 кг и более препарат РИВАРОКСАБАН показан для:

Способ применения и дозы

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза и способ применения Доза препарата подбирается индивидуально и корректируется лечащим врачом. Взрослые Если у Вас есть проблемы с почками, Ваш лечащий врач может рекомендовать сниженную дозу препарата РИВАРОКСАБАН - одна таблетка 15 мг один раз в сутки. Если Вы нуждаетесь в процедуре лечения закупорки кровеносных сосудов сердца, называемой "чрескожное коронарное вмешательство", с введением внутрисосудистого протеза (стента), Ваш лечащий врач может назначить препарат РИВАРОКСАБАН по одной таблетке 15 мг один раз в сутки в комбинации с антиагрегантными средствами, например, клопидогрелом. Дети и подростки Доза

препарата РИВАРОКСАБАН зависит от массы тела и рассчитывается лечащим врачом индивидуально. Доза препарата РИВАРОКСАБАН рассчитывается исходя из массы тела, поэтому важно не пропускать назначенные лечащим врачом визиты, чтобы вовремя скорректировать дозу в зависимости от изменения веса. Никогда не изменяйте дозу препарата РИВАРОКСАБАН самостоятельно. Лечащий врач скорректирует дозу при необходимости. Путь и/или способ введения Внутрь, запивая водой. Принимайте препарат РИВАРОКСАБАН в одно и то же время суток, во время еды. При необходимости врач может ввести измельченную таблетку через желудочный зонд. В этом случае сразу после введения измельченной таблетки через желудочный зонд также вводят питательную смесь. Дети с массой тела не менее 30 кг Детям препарат РИВАРОКСАБАН рекомендуется принимать во время еды, запивая водой. Препарат РИВАРОКСАБАН следует принимать с интервалом примерно 24 часа. В случае, если после приема препарата была рвота: В случае повторной рвоты после приема препарата РИВАРОКСАБАН проконсультируйтесь с лечащим врачом. При необходимости врач может ввести измельченную таблетку через желудочный зонд. В этом случае сразу после введения измельченной таблетки через желудочный зонд также вводят питательную смесь. Продолжительность терапии Принимайте препарат РИВАРОКСАБАН ежедневно, пока врач не отменит лечение. Принимайте таблетки в одно и то же время дня. Это поможет Вам не забывать об их приеме. Решение о длительности терапии препаратом РИВАРОКСАБАН принимает Ваш лечащий врач. Если Вам необходимо провести процедуру восстановления сердечного ритма (кардиоверсию), примите препарат РИВАРОКСАБАН в соответствии с рекомендациями врача. Если Вы забыли принять препарат РИВАРОКСАБАН Взрослые, дети и подростки Если Вы принимаете препарат РИВАРОКСАБАН по одной таблетке 15 или 20 мг один раз в сутки и случайно пропустили прием, примите пропущенную дозу как можно скорее. Не принимайте более одной таблетки в сутки, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Примите следующую таблетку на следующий день, а затем продолжите прием препарата РИВАРОКСАБАН в обычной дозе (один раз в сутки). Взрослые Если Вы принимаете препарат РИВАРОКСАБАН по одной таблетке 15 мг 2 раза в сутки и случайно пропустили прием, примите пропущенную дозу как можно скорее. Не принимайте более 2 таблеток 15 мг в сутки. Если Вы забыли принять дозу, можно принять 2 таблетки 15 мг одновременно, что в совокупности составит 30 мг в сутки. На следующий день продолжите прием по одной таблетке 15 мг 2 раза в сутки согласно рекомендациям врача. Если Вы прекращаете прием препарата РИВАРОКСАБАН Не прекращайте прием препарата РИВАРОКСАБАН без консультации с лечащим врачом. Прием препарата РИВАРОКСАБАН снижает риск развития тяжелых состояний (сердечного приступа, инсульта, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний). При наличии вопросов по применению препарата проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или работником аптеки.

Противопоказания

Не принимайте препарат РИВАРОКСАБАН: Если любое из перечисленных утверждений относится к Вам, обязательно сообщите об этом врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Не принимайте препарат РИВАРОКСАБАН, если Вы беременны или кормите грудью. Женщинам, способным иметь детей, следует использовать эффективные методы контрацепции в период лечения препаратом. Если Вы забеременели во время применения препарата РИВАРОКСАБАН, незамедлительно сообщите об этом лечащему врачу, который определит план Вашего дальнейшего лечения.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, РИВАРОКСАБАН может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Подобно другим сходным антитромботическим лекарственным препаратам, РИВАРОКСАБАН может вызывать кровотечения, которые могут представлять угрозу для жизни. Выраженное кровотечение может вызвать резкое снижение артериального давления (шок). В некоторых случаях кровотечение может быть скрытым. Немедленно прекратите прием препарата и сообщите врачу о наличии любой из следующих серьезных нежелательных реакций у Вас или Вашего ребенка: Другие возможные нежелательные реакции Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000): Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000): Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): Нежелательные реакции у детей и подростков По типу нежелательные реакции у детей и подростков, которых лечили препаратом РИВАРОКСАБАН, были схожи с таковыми у взрослых и были умеренной или средней интенсивности. Нежелательные реакции, более частые у детей и подростков Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10): Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

Передозировка

Если Вы приняли препарата РИВАРОКСАБАН больше, чем следовало Если Вы случайно приняли препарата РИВАРОКСАБАН больше, чем следовало, немедленно проконсультируйтесь с врачом. Прием большой дозы препарата РИВАРОКСАБАН повышает риск развития кровотечений.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. До начала применения препарата РИВАРОКСАБАН обязательно сообщите лечащему врачу, если Вы или Ваш ребенок принимаете какие-либо из следующих лекарственных препаратов, поскольку эффект препарата РИВАРОКСАБАН может усиливаться: В этом случае лечащий врач примет решение о необходимости терапии препаратом РИВАРОКСАБАН и более тщательного наблюдения за Вашим состоянием. При повышенном риске развития язв желудка или кишечника лечащий врач может назначить профилактическое противоязвенное лечение. До начала применения препарата РИВАРОКСАБАН обязательно сообщите лечащему врачу, если Вы или Ваш ребенок принимаете какие-либо из следующих лекарственных препаратов, поскольку эффект препарата РИВАРОКСАБАН может снизиться: В этом случае лечащий врач примет решение о необходимости терапии препаратом РИВАРОКСАБАН и более тщательного наблюдения за Вашим состоянием.

Особые указания

Хирургические вмешательства Очень важно принимать препарат РИВАРОКСАБАН до и после хирургического вмешательства именно в то время, которое Вам указал лечащий врач. Если во время хирургического вмешательства была проведена катетеризация или пункция в область спинного мозга (например, эпидуральная или спинномозговая анестезия (обезболивание)): Кожные реакции При применении ривароксабана описаны случаи тяжелых кожных реакций, в том числе угрожающих жизни. При появлении сильной сыпи в сочетании с лихорадкой, волдырей или поражений слизистых оболочек немедленно обратитесь к врачу. Дети и подростки Не давайте препарат РИВАРОКСАБАН детям и подросткам от 0 до 18 лет с массой тела менее 30 кг для лечения и профилактики венозной тромбоэмболии. Препарат РИВАРОКСАБАН содержит лактозы моногидрат Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата. Препарат РИВАРОКСАБАН содержит натрий Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной таблетке.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:При применении ривароксабана отмечались случаи обмороков (нечасто) и головокружения (часто) (см. раздел 4 листка-вкладыша), которые могут влиять на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами. Пациентам, у которых возникают данные неблагоприятные реакции, не следует управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для детей месте, так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Хранить при температуре не выше 25 °C.