Инструкция по применению
Ронколейкин раствор для инфузий и подкожного введения 1000тыс МЕ 3 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор для инъекций
Страна: Россия
Производитель: Биотех
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Интерлейкин-2 человека рекомбинантный
Количество в упаковке: 3
Дозировка действующего вещества: 1 000 000 МЕ

Описание

Препарат представляет собой прозрачную бесцветную или светло-желтого цвета жидкость. При хранении при температуре 2°С до 8°С возможно выпадение кристаллов натрия лаурилсульфата, которые должны растворяться при комнатной температуре в течение 30 мин. Для ускорения растворения можно наклонять ампулу, избегая резкого перемешивания жидкости и пенообразования.

Действующее вещество

Интерлейкин-2 человека рекомбинантный

Состав

Состав 1 мл раствора:активные вещества: интерлейкин-2 человека рекомбинантный 1 мг (= 1 000 000 МЕ),вспомогательные вещества: натрия лаурилсульфат - 10 мг, маннитол - 50 мг, дитиотреитол - 0,08 мг, аммония гидрокарбонат - 0,79 мг, вода для инъекций - до 1 мл.

Форма выпуска

Раствор для инъекций

Показания

В составе комплексной терапии у взрослых: обычный вариабельный иммунодефицит, комбинированный иммунодефицит, острый перитонит, острый панкреатит, остеомиелит, эндометрит, тяжелая пневмония, сепсис, послеродовый сепсис, туберкулез легких, другие генерализованные и тяжелые локализованные инфекции, инфицированные термические и химические ожоги, диссеминированные и местнораспространенные формы почечноклеточного рака.у детей с 0 лет: обычный вариабельный иммунодефицит, комбинированный иммунодефицит, острый перитонит, острый панкреатит, остеомиелит, тяжелая пневмония, бактериальный сепсис новорожденных, сепсис, другие генерализованные и тяжелые локализованные инфекции.

Способ применения и дозы

Состав 1 мл раствора:активные вещества: интерлейкин-2 человека рекомбинантный 1 мг (= 1 000 000 МЕ),вспомогательные вещества: натрия лаурилсульфат - 10 мг, маннитол - 50 мг, дитиотреитол - 0,08 мг, аммония гидрокарбонат - 0,79 мг, вода для инъекций - до 1 мл.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к интерлейкину-2 или любому компоненту препарата в анамнезе, аллергия к дрожжам, беременность, аутоиммунные заболевания, сердечная недостаточность III ст., легочно-сердечная недостаточность III ст., метастатическое поражение головного мозга, терминальная стадия почечноклеточного рака.С осторожностью при хронической почечной недостаточности, декомпенсированной печеночной недостаточности.

Побочные действия

В отдельных случаях в процессе введения Ронколейкина® возможно появление кратковременного озноба и повышение температуры тела, что купируется обычными терапевтическими средствами и не является основанием для прерывания введения препарата, а также курса лечения. При подкожном введении препарата отмечались местные реакции - болезненность, уплотнение, покраснение в месте инъекции.

Передозировка

В отдельных случаях в процессе введения Ронколейкина® возможно появление кратковременного озноба и повышение температуры тела, что купируется обычными терапевтическими средствами и не является основанием для прерывания введения препарата, а также курса лечения. При подкожном введении препарата отмечались местные реакции - болезненность, уплотнение, покраснение в месте инъекции.

Взаимодействие с другими препаратами

Лечение препаратом Ронколейкин® можно сочетать с лечением всеми другими лекарственными средствами. При применении РонколейкинаÒ на фоне длительной терапии препаратами глюкокортикостероидов активность действия препарата может снижаться. Ронколейкин® нельзя смешивать с другими лекарственными препаратами в одном шприце или флаконе.

Особые указания

Влияние на способность управлять транспортными средствамиСпециальных исследований влияния препарата на способность управлять транспортными средствами и использовать сложное оборудование не проводилось. В случае развития нежелательных реакций со стороны органа зрения и/или снижения способности к концентрации внимания и быстроты реакции пациентам рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами или работы со сложным оборудованием до разрешения указанных нежелательных реакций.

Условия хранения

Лечение препаратом Ронколейкин® можно сочетать с лечением всеми другими лекарственными средствами. При применении РонколейкинаÒ на фоне длительной терапии препаратами глюкокортикостероидов активность действия препарата может снижаться. Ронколейкин® нельзя смешивать с другими лекарственными препаратами в одном шприце или флаконе.