Инструкция по применению
Ротапрост Капсулы 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Болгария
Производитель: Кенди ЛТД
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30

Описание

Биологически активная добавка является дополнительным источником цинка, селена, некоторых биофлаваноидов, витаминов и микроэлементов. Способствует поддержанию функциональной активности предстательной железы. Сухие экстракты плодов карликовой пальмы и корней крапивы оказывают антиандрогенный, противовоспалительный, противоотечный и антипролиферативный эффекты, избирательно проявляющиеся на уровне предстательной железы. При этом не оказывают влияния на уровень половых гормонов в плазме крови, не влияют на потенцию и либидо. Механизм местного антиандрогенного действия обусловлен ингибированием синтеза дигидротестостерона (за счет угнетения фермента 5-альфа-редуктазы) и его фиксации к цитозольным рецепторам, что препятствует проникновению гормона в ядро. В результате этого уменьшается синтез белка. Механизм местного противовоспалительного действия обусловлен тем, что экстракт Serenoa repens ингибирует активность фосфолипазы А2 и высвобождение арахидоновой кислоты, тем самым уменьшая синтез простагландинов и лейкотриенов, которые являются медиаторами воспаления. В течение первых недель терапии уменьшается проницаемость капилляров и сосудистый стаз, уменьшается отечность и воспалительный процесс в простате, устраняется компрессия шейки мочевого пузыря и мочевыводящего канала, улучшая показатели уродинамики. Местное антипролиферативное действие продукта проявляется снижением активности факторов роста (прежде всего эпидермального и фибробластического) и ускорением процессов апоптоза клеток простаты, что отражается в торможении роста и последующем уменьшении объема предстательной железы. Сухой экстракт семян

тыквы Высокое содержание токоферолов (альфа-, бета-, гамма-, сигма-изомеры) и каротиноидов оказывает выраженное антиоксидантное действие, угнетающее процессы перекисного окисления липидов в биологических мембранах. Суммарная совокупность фармакологических свойств биологически активных веществ, содержащихся в семенах тыквы, определяет его противовоспалительное и цитопротекторное действие. Обладая антиандрогенными свойствами, экстракт семян тыквы снижает пролиферацию клеток предстательной железы, нормализует ее функцию за счет улучшения микроциркуляции и противовоспалительного действия. Цинк стабилизирует клеточные мембраны, влияет на процессы регенерации, передачу нервных импульсов, оказывает иммуномодулирующее действие на Т-клеточное звено иммунитета и повышает факторы неспецифической иммунной защиты. Селен оказывает антиоксидантное действие, снижает воздействие на организм внешних негативных факторов, способных усиливать образование свободных радикалов. Показания - нарушения мочеиспускания - нарушения мочеиспускания при простатите, - профилактика рецидивов после оперативного лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Пищевая ценность (содержание в 1 твердой желатиновой капсуле): белки - 0,09 г, углеводы - 0,03 г, жиры - 0,06 г. Энергетическая ценность: 1,02 ккал / 4,27 кДж. Твердые желатиновые капсулы размера №0, темно-коричневого цвета, содержащие порошок от темно-желтого до коричневого цвета с белыми частицами.

Состав

1 твёрдая желатиновая капсула содержит: Активные вещества: Сухой экстракт семян тыквы 200 мг Сухой экстракт корней крапивы (Urtica dioica) 150 мг Сухой экстракт плодов карликовой пальмы (Serenoa repens) 80 мг Селен (в форме натрия селенита) 22,5 мкг (32% от РСП) Цинк (в форме цинка пиколината) 0,105 мг (0,7% от РСП) РСП* - рекомендуемый уровень суточного потребления Вспомогательный компонент: стабилизатор магния стеарат (Е470) Состав оболочки капсулы: краситель железа оксид черный (Е172), краситель титана диоксид (Е171), краситель железа оксид красный (Е172), желатин.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - для поддержания мочеполовой системы.

Способ применения и дозы

Взрослым назначают по 1 капсуле 2 раза в сутки (утром и вечером). Капсулы следует принимать внутрь, независимо от приема пищи, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Продолжительность приема не менее 30 дней. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Оптимальную схему и повторные курсы приема устанавливает и назначает врач индивидуально в каждом случае.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.