Инструкция по применению
Ротокан Экстракт для приема внутрь и местного применения 50 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКАЯ ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Жидкость темно-бурого цвета с оранжевым оттенком и специфическим запахом. При хранении допускается появление осадка.

Состав

Для приготовления 1000 мл экстракта используют: Цветки ромашки - 500,0 г Цветки ноготков - 250,0 г Траву тысячелистника - 250,0 г Спирт этиловый 40 % - достаточное количество до получения 1000 мл препарата.

Форма выпуска

Раствор

Показания

В стоматологии: у взрослых - воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта и пародонта различной этиологии (афтозный стоматит, пародонтит, язвенно-некротический гингивостоматит). В гастроэнтерологии: гастродуодениты, хронические энтериты и колиты (в комплексном лечении).

Способ применения и дозы

Местно, внутрь, ректально. Ротокан применяют в виде водного раствора, который готовят перед применением путем добавления 1 чайной ложки ротокана на стакан теплой кипяченой воды. При хорошей переносимости дозу можно увеличить до 3 чайных ложек на стакан воды. При заболеваниях слизистой оболочки полости рта раствор ротокана применяют путем аппликаций (15-20 минут) или полосканий (1-2 минуты) 2-3 раза в день в течении 2-5 дней. Лечение пародонта проводят после удаления зубных отложений и выскабливания паталогических десневых карманов. В десневые карманы вводят на 20 минут тонкие турунды, обильно смоченные раствором ротокана. Процедуру проводят 1 раз в сутки ежедневно или через день, всего 4-6 раз. В гастроэнтерологии ротокан применят внутрь и в микроклизмах. Внутрь применяют по 1/3-1/2 стакана раствора за 30 минут до еды или через 40-60 минут после еды, 3-4 раза в день. Курс лечения 2-3 недели. Микроклизмы с 50-100 мл раствора ротокана применяют после очистительной клизмы 1-2 раза в сутки. Курс лечения 3-6 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 12 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.