Инструкция по применению
Ротокан Раствор 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Жидкость
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Календулы лекарственной цветков экстракт+Ромашки аптечной цветков экстракт+Тысячелистника обыкновенного травы экстракт
Количество в упаковке: 1

Описание

Жидкость темно-коричневого с оранжевым оттенком цвета с характерным запахом. При хранении допускается появление осадка.

Действующее вещество

Календулы лекарственной цветков экстракт+Ромашки аптечной цветков экстракт+Тысячелистника обыкновенного травы экстракт

Состав

Для приготовления 1000 мл экстракта необходимо:Ромашки цветков - 500 гНоготков цветков - 250 гТысячелистника травы - 250 гСпирта этилового 40 % (этанол) - достаточное количество до получения 1000 мл экстракта.

Форма выпуска

Жидкость

Показания

В стоматологии: воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта и пародонта различной этиологии (афтозный стоматит, пародонтит, язвенно-некротический гингивостоматит).В гастроэнтерологии: гастродуоденит, хронический энтерит и колит (в комплексном лечении).

Способ применения и дозы

Внутрь, местно, ректально.В виде водного раствора, который готовят перед применением путем добавления 1 чайной ложки препарата на стакан теплой кипяченой воды. При хорошей переносимости дозу можно увеличить до 3 чайных ложек на стакан воды.При заболеваниях слизистой оболочки полости рта раствор препарата применяют путем аппликаций (15-20 минут) или полосканий (1-2 минуты) 2-3 раза в день в течение 2-5 дней. Лечение заболеваний пародонта проводят после удаления зубных отложений и выскабливания патологических десневых карманов. В десневые карманы вводят на 20 минут тонкие турунды, обильно смоченные раствором препарата. Процедуру проводят 1 раз в сутки ежедневно или через день, всего 4-6 раз.В гастроэнтерологии препарат применяют внутрь и в микроклизмах (ректально). Внутрь применяют по 1/3-1/2 стакана водного раствора (60-100 мл) за 30 минут до еды или через 40-60 минут после еды, 3-4 раза в день. Курс лечения 2-3 недели. Микроклизмы с 50-100 мл водного раствора препарата применяют после очистительной клизмы 1-2 раза в сутки. Курс лечения 3-6 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет, заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применение ротокана при беременности и в период грудного вскармливания в связи с высоким содержанием этанола в препарате.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки препаратом не зарегистрировано.При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны головокружение, тошнота, рвота.Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучено.

Особые указания

Препарат содержит не менее 33 % этанола. При разведении 1 чайной ложки препарата в стакане воды содержание этанола в максимальной разовой дозе составляет 0,8 г, в максимальной суточной дозе - 3,2 г. При разведении 3 чайных ложек препарата в стакане воды содержание этанола в максимальной разовой дозе - 2,4 г, в максимальной суточной дозе - 9,6 г.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:При применении препарата следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами и.т.п.).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 12 до 15 °С.Хранить в недоступном для детей месте.