Инструкция по применению
Ротокан Экстракт для приема внутрь местного применения 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Календулы лекарственной цветков экстракт+Ромашки аптечной цветков экстракт+Тысячелистника обыкновенного травы экстракт
Количество в упаковке: 1

Действующее вещество

Календулы лекарственной цветков экстракт+Ромашки аптечной цветков экстракт+Тысячелистника обыкновенного травы экстракт

Состав

Жидкий экстракт, получаемый из смеси лекарственного растительного сырья: цветков ромашки, цветков ноготков и травы тысячелистника в соотношении 2: 1: 1.

Форма выпуска

Раствор

Показания

В стоматологии ротокан применяют у взрослых при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта различной этиологии и пародонта, таких как афтозный стоматит, пародонтит, язвенно-некротический гингивостоматит. В гастроэнтерологии ротокан применяют в комплексном лечении при гастродоуденитах, хронических энтеритах и колитах.

Способ применения и дозы

Ротокан применяют в виде водного раствора, который готовят перед применением путем добавления 1 чайной ложки ротокана на стакан теплой кипяченой воды. При хорошей переносимости дозу можно увеличить до 3 чайных ложек на стакан воды. При заболеваниях слизистой оболочки полости рта раствор ротокана применяют путем аппликаций (15-20 минут) или ротовых полосканий (1-2 минуты) 2-3 раза в день в течение 2-5 дней. Лечение пародонта проводят после удаления зубных отложений и выскабливания патологических десневых карманов. В десневые карманы вводят на 20 минут тонкие турунды, обильно смоченные раствором ротокана Процедуру проводят 1 раз в сутки ежедневно или через день, всего 4-6 раз. В гастроэнтерологии ротокан применяют внутрь и в микроклизмах. Внутрь применяют по 1/3-1/2 стакана раствора за 30 минут до еды или через 40-60 минут после еды, 3-4 раза в день. Курс лечения 2-3 недели. Микроклизмы с 50-100 мл раствора ротокана применяют после очистительной клизмы 1-2 раза в сутки. Курс лечения 3-6 дней.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость к компонентам препарата.

Побочные действия

Не выявлено.

Передозировка

Острые отравления и передозировки маловероятны.