Инструкция по применению
Розамет Крем для наружного применения 1 % 25 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Хорватия
Производитель: Ядран
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Метронидазол
Количество в упаковке: 1



Действующее вещество

Метронидазол

Состав

Действующее вещество: Метронидазол (Metronidazolum)Концентрация действующего вещества (мг): 10

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

При местном применении препарат практически не всасывается.

Показания

Воспаленные папулы, пустулы;- эритемы при розовых и вульгарных угрях (acne rozacea, acne vulgaris);- баланопостит;- вульвовагинит.

Способ применения и дозы

Наружно. Лечение воспаленных папул, пустул, эритемы при розовых и вульгарных угрях (acnerozacea, acnevulgaris): наносят на предварительно очищенную с помощью теплой воды или легкого детергента кожу тонким слоем и втирают 1-2 раза в сутки, утром и вечером. Курс лечения 1-2 мес. Между очищением кожи и нанесением крема рекомендуется делать перерыв 15-20 мин. Терапевтический эффект наступает примерно через 3 недели. Средняя продолжительность лечения - 3-4 мес. Баланопостит, вульвовагинит: выдавив из тюбика небольшое количество крема, наносят на поверхность очагов поражения головки полового члена, крайней плоти, области малых половых губ, преддверия влагалища, с помощью ватного тампона или пальцев рук, слегка втирая, 1-2 раза в сут. Продолжительность лечения - 8-10 дней.

Противопоказания

Гиперчувствительность.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью: беременность (I триместр), период лактации.

Побочные действия

Побочные явления после наружного применения метронидазола возникают крайне редко. Возможны аллергические реакции (крапивница, кожная сыпь); гиперемия, шелушение и жжение кожи, слезотечение.

Передозировка

Данных о случаях передозировки при местном применении не имеется.

Взаимодействие с другими препаратами

После наружного применения концентрация метронидазола очень низкая и возможность взаимодействия минимальная. При одновременном назначении усиливает действие варфарина и других непрямых антикоагулянтов.

Особые указания

Препарат предназначен только для наружного применения. Избегать контакта с глазами, поскольку это может вызвать воспаление глаз и слезотечение. В случае попадания крема в глаза их следует промыть большим количеством воды. В случае возникновения кожного воспаления, частоту применения препарата следует снизить или временно прекратить. Во время применения препарата следует избегать прямых солнечных лучей.