Инструкция по применению
Румалайя Таблетки 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Хималайя
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Компоненты растительного происхождения
Количество в упаковке: 1

Описание

Круглые, двояковыпуклые таблетки без оболочки, зеленовато-коричневого цвета с вкраплениями более светлого и более темного цвета.

Действующее вещество

Компоненты растительного происхождения

Состав

Каждая таблетка содержит: Активные компоненты: Порошки: Махайоградж гуггул 324,0 мг Мумие 32,0 мг Сварнамакшик бхасма 10,0 мг Шанкх бхасма 130,0 мг Абельмоша мускусного семян 20,0 мг Экстракт жидкий водный из смеси растительного сырья: Махараснади кват 130,0 мг Моринги крылатосеменной листьев и семян 32,0 мг Марены сердцелистной корней 38,0 мг Тиноспоры сердцелистной стеблей 20,0 мг Якорцев стелющихся плодов 32,0 мг Обработанные над паром экстракта из: прутняка китайского листьев, тиноспоры сердцелистной стеблей, базилика священного целого растения, эклипты белой целого растения, витании снотворной корней, имбиря лекарственного корневища, дашамулы смеси корней. Название производящих растений на латинском языке: Абельмош мускусный (Hibiscus abelmoschus L., сем. Malvaceae) Моринга крылатосеменная (Moringa pterygosperma Lam., сем. Moringaceae) Марена сердцелистная (Rubia cordifolia L.s.l., сем. Rubiaceae) Тиноспора сердцелистная (Tinospora cordifolia L, сем. Menispermaceae) Якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris L., сем. Zygophyllaceae) Прутняк китайсюш (Vitex negundo L., сем. Verbenaceae) Базилик священный (Ocimum sanctum L., сем. Lamiaceae) Эклипта белая (Eclipta alba Hassk., сем. Asteraceae) Витания снотворная (Withania somnifera L., сем. Solanaceae) Имбирь лекарственный (Zingiber officinale Roscoe, сем. Zingiberaceae) Вспомогательные.вещества: магния стеарат 3,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая 65,5 мг, кармеллоза натрия 19,5 мг, кремния диоксид коллоидный 3,0 мг, кросповидон 31,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике многокомпонентного растительного препарата Румалайя в лекарственной форме таблетки отсутствуют. Активность препарата обусловлена взаимно усиливающим сочетанным действием его компонентов, что характерно для растительных лекарственных средств. Поскольку активность препарата нельзя полностью отнести за счет какого-либо одного соединения, фармакокинетические исследования многокомпонентных растительных препаратов, в том числе Румалайя таблетки, неосуществимы.

Показания

Воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата: ревматоидный артрит, остеоартроз.

Способ применения и дозы

Внутрь. По 2 таблетки 3 раза в день после еды в течение 4 недель. В случае появления диспепсических явлений доза препарата может быть снижена до 1 таблетки 3 раза в день. Проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (кожный зуд, крапивница). Возможны диспепсические явления (тошнота, диарея, ощущение горечи во рту), транзиторное повышение активности "печеночных" трансаминаз. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени сведений о случаях передозировки при применении препарата не поступало. Лечение в случае передозировки: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат Румалайя таблетки совместим с другими нестероидными противовоспалительными средствами.

Особые указания

При прекращении приема препарата Румалайя в лекарственной форме таблетки о возникновении синдрома "отмены" не сообщалось. Специальных мер при пропуске одной или нескольких доз препарата не требуется. В случае если пациент один или несколько раз пропускает прием лекарственного средства, следует продолжать прием препарата по рекомендованной в инструкции схеме, не удваивая дозы. Для усиления терапевтического эффекта возможно одновременное применение с препаратом Румалайя крим в лекарственной форме крем для наружного применения.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Данных о влиянии препарата на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, нет.

Условия хранения

При температуре от 10 °С до 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.