Инструкция по применению
Румалон Раствор для внутримышечного введения 1 мл ампулы 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гликозаминогликан-пептидный комплекс
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Гликозаминогликан-пептидный комплекс

Состав

Действующее вещество: гликозаминогликан-пептидный комплекс из хрящей и костного мозга молодых телят до 6 месяцевКонцентрация действующего вещества (%): 100%

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

Исследования не проводились.

Показания

Остеоартроз, спондилоартроз (заболевание позвоночника), менископатии (заболевание хряща прокладки коленного сустава, сопровождающееся болями и нарушением его функции), хондромалляция надколенника (омертвение суставного хряща надколенника).

Способ применения и дозы

Применяется только для внутримышечных инъекций. После определения переносимости препарата (введение 0,25 мл, а затем, с интервалом в 2 дня, введение 0,5 мл) его вводят в количестве 1 или 2 мл 2-3 раза в неделю. Курс включает 25 инъекций по 1 мл или 15 инъекций по 2 мл. Курсы инъекций повторяют 2 раза в год (в выраженных случаях 3-4 раза в год) в течение многих лет.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (в связи с отсутствием сведений о применении препарата у данных групп пациентов).

Побочные действия

Аллергические реакции (редко).

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат Румалон можно применять одновременно с НПВП и ГКС.При одновременном применении с непрямыми антикоагулянтами, антиагрегантными средствами и фибринолитиками возможно усиление их действия.

Особые указания

При одновременном применении с непрямыми антикоагулянтами, антиагрегантными средствами и фибринолитиками необходим частый контроль показателей свертывания крови.Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмамиПрименение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

В сухом месте