Инструкция по применению
Русвиск протез синовиальной жидкости Шприц 2 мл 1 шт

Характеристики



Форма выпуска: Ампулы
Страна: Россия
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гиалуронат натрия
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 100 мг+25 мг

Описание

Протез синовиальной жидкости РусВиск – медицинское изделие для временной замены синовиальной жидности или в дополнение к ней. Вязкэластичный эндопротез представляет собой буферизованный физиологический раствор гиалуроната натрия неживотного происхождения (pH 7–7,5). Поставляется в стеклянном шприце однократного применения, в стерильном виде и предназначен только для внутрисуставного введения.

Действующее вещество

Гиалуронат натрия

Состав

Гиалуронат натрия, соль, гидрофосфат натрия, дигидрофосфат натрия.

Форма выпуска

Ампулы

Показания

Боль и ограничение подвижности при дегенеративно-дистрофических и травматических изменениях тазобедренного, коленного сустава и других синовиальных суставов. РусВиск применяется для локальной терапии остеоартроза I – III стадии.

Способ применения и дозы

Предназначен для внутрисуставных инъекций, которые должен выполнять врач, имеющий специальную подготовку, в помещении, оборудованном для внутрисуставного введения препарата с соблюдением всех правил асептики. Недопустимо введение в внутрисосудистое или внесуставное пространство, а также в ткани синовии или капсулы сустава.Шприц следует достать из холодильника не менее чем за 20 минут до применения. Любой внутрисуставной выпот следует удалить перед введением РусВиск. Выполните тщательную обработку зоны инъекции соответствующим антисептиком. Убедитесь в целостности индивидуальной стерильной упаковки, затем осторожно удалите её, чтобы достать шприц. Удалите воздух из шприца и введите препарат в синовиальную полость сустава с помощью иглы 21 Gauge Luer Lock. Курс локальной терапии гонартроза с помощью РусВиск 3-5 инъекции с недельным интервалом между каждой. Возможно одновременное введение в несколько суставов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам состава, Одновременный прием антикоагулянтов, Тяжёлое воспаление или инфицирование сустава, а также с внутрисуставной выпот, Активное заболевание кожи или кожная инфекция в месте введения или в непосредственной близости от места введения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано

Побочные действия

Боль во время инъекции, а также покраснения или отек в области сустава, Ограничение подвижности в суставе. Эти явления кратковременны и проходят самопроизвольно. При сохранении этих симптомов более одной недели пациент должен обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Отмечена несовместимость между гиалуронатом натрия и четвертичными солями аммония, такими как бензалкония хлорид. Следовательно, ни в коем случае не следует допускать контакт РусВиск с такими препаратами или с медицинскими и хирургическими инструментами, обработанными такими препаратами.

Особые указания

Не стерилизуйте повторно: шприцы одноразовые.

Условия хранения

Храните при температуре от +5°C до +25°C. Предохранять от солнечного света. Допускается транспортировка при температурном режиме +2°C до +25°C. Не замораживать. Внимание: Запрещено использовать материал при нарушении целостности упаковки! Категорически: Введение препарата РусВиск должно проводиться только врачом в медицинском учреждении, в помещении, оборудованном для внутрисуставного введения препаратов.