Инструкция по применению
Рузам Раствор для подкожного введения ампулы 0,2 мл 5 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: ДЕКО
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Экстракт из культуры штамма золотистого стафилококка
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 0.2 мл
Срок годности: 48.0

Действующее вещество

Экстракт из культуры штамма золотистого стафилококка

Состав

Действующее вещество: экстракт из культуры термофильного штамма золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus, штамм С -2) - 0,2 мл. Вспомогательные вещества: раствор натрия хлорида для инъекций 0,9%, фенол 0,025 &mdash, 0,5%.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Сезонный (поллинозы) и круглогодичные аллергические риниты, бронхиальная астма, крапивница и отек Квинке, атопический и другие аллергические дерматиты, частые респираторные инфекции.

Способ применения и дозы

Подкожно взрослым и детям старше 6 лет по 0,2 мл 1 раз в неделю, детям от 4 до 6 лет по 0,1 мл 1 раз в неделю, курс 5 - 10 недель. В течение года может быть проведено от 1 до 4 курсов. При поллинозе препарат вводится за 6-8 недель до периода цветения аллергенного растения. При частых респираторных инфекциях профилактику следует проводить весной и осенью.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, беременность и период грудного вскармливания, детский возраст до 4 лет, острая инфекция, туберкулез в активной форме, декомпенсированные заболевания внутренних органов.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Повышение температуры тела до субфебрильных цифр, слабость, обострение хронического очага инфекции, кратковременное усиление кашля при хроническом бронхите, усиление высыпаний на коже при кожной аллергии. Эти симптомы, как правило, слабо выражены и преходящи, не требуют отмены препарата.

Передозировка

Случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействия препарата Рузам ,с другими лекарственными средствами не зарегистрировано. Рузам ,может быть назначен вместе с антигистаминными, глюкокортикостероидными препаратами или антибиотиками.

Особые указания

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстроты реакции (управление автомобилем и др.). Оставшийся в ампуле раствор не использовать.

Условия хранения

В сухом месте