Инструкция по применению
Рыбий жир 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Жидкость
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Рыбий жир из печени трески
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная маслянистая жидкость от светло-желтого до желтого цвета со специфическим непрогорклым запахом.

Действующее вещество

Рыбий жир из печени трески

Состав

Рыбий жир из печени тресковых рыб

Форма выпуска

Жидкость

Показания

Гипо- и авитаминоз A и D (частые респираторные заболевания реконвалесценция нарушения роста костей снижение зрения нарушение структуры кожи волос ногтей зубов рахит), профилактика остеопатий разного генеза.

Способ применения и дозы

Внутрь. Препарат рекомендуется принимать во время еды. Режим дозирования: детям с 3-х месяцев - 1/2 чайной ложки (2,5 мл) в день; детям в возрасте 1 года - 1 чайную ложку (5 мл) в день; детям с 2 лет - по 1-2 чайные ложки в день; детям с 3 до 6 лет - по 1 десертной ложке (10 мл) в день; детям с 7 лет и взрослым - по 1 столовой ложке (15 мл) в день. Курс лечения назначает лечащий врач в зависимости от показаний к применению.

Противопоказания

Гиперчувствительность гипокоагуляция гемофилия хронический холецистит и панкреатит (и периоды их обострения) активная форма туберкулеза легких тиреотоксикоз хроническая почечная недостаточность гипервитаминоз витаминов A и D гиперкальциемия гиперкальциурия саркоидоз кальциевый нефроуролитиаз длительная иммобилизация детский возраст до 3 месяцев.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности не рекомендуется. Применение в период грудного вскармливания возможно если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом!

Побочные действия

Аллергические реакции, диарея, снижение свертываемости крови, запах рыбы изо рта.

Передозировка

При продолжительном применении препарата может возникнуть сонливость вялость головная боль снижение аппетита тошнота рвота диарея боль в костях нижних конечностей.Лечение: симптоматическое отмена препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении препарата с другими лекарственными средствами содержащими витамины AиD существует возможность развития витаминной интоксикации. Необходимо соблюдать особую осторожность при одновременном приеме препарата и лекарственных средств влияющих на свертываемость крови.

Особые указания

Перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом! Рекомендуется прекратить прием препарата не менее чем за 4 дня до проведения оперативного лечения или другого хирургического вмешательства.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 10 0С.Допускается замораживание.Хранить в недоступном для детей месте.