Инструкция по применению
Рыбий жир-Тева Капсулы 500 мг 100 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Венгрия
Производитель: ТЕВА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Рыбий жир из печени трески
Количество в упаковке: 100
Дозировка действующего вещества: 500 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Рыбий жир из печени трески

Состав

Рыбий жир 500 мг Вспомогательные вещества: желатин - 128.95 мг, глицерол - 42.04 мг, сорбитол 70% некристаллизующийся - 17.19 мг, вода - 10.87 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

— профилактика состояний, обусловленных дислипидемией (нарушение липидного обмена); — комплексная терапия нарушений липидного обмена, включающая диету, статины, антиагреганты.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь по 1-2 капсулы 3 раза/сут после еды, запивая холодной или чуть теплой водой. Рекомендуется сразу проглатывать капсулы, запивая их большим количеством воды, не следует держать их во рту долгое время, т.к. желатин, входящий в состав оболочки, может сделать капсулу клейкой, что затруднит последующее проглатывание. Курс лечения - 2-3 мес. Далее рекомендуется сделать общий анализ крови и продолжить прием препарата в зависимости от результатов.

Противопоказания

— хронический холецистит и панкреатит (и периоды их обострения); — одновременное применение фибратов, пероральных антикоагулянтов; — при тяжелых травмах, хирургических операциях (в связи с риском увеличения времени кровотечения); — беременность; — период лактации; — детский возраст; — повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано к применению при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, снижение свертываемости крови, обострение хронического холецистита и панкреатита/диарея, запах рыбы изо рта.

Передозировка

Симптомы:возможно обострение холелитиаза и хронического панкреатита. Лечение: симптоматическое, отмена препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Пациентам, проходящим курс лечения в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями или принимающим препараты, влияющие на скорость свертывания крови, не рекомендуется принимать Рыбий жир.

Особые указания

Пациенты, находящиеся на антикоагулянтной терапии, в период приема Рыбьего жира должны быть под постоянным врачебным наблюдением, а при необходимости следует проводить соответствующую коррекцию дозы антикоагулянта.

Условия хранения

В сухом месте