Инструкция по применению
Эвалар Сабельник Настойка 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Сабельника болотного корневища
Количество в упаковке: 1

Действующее вещество

Сабельника болотного корневища

Состав

Активный компонент: Сабельника болотного корневища - 100 г Вспомогательное вещество: Этанол (спирт этиловый) 40 % - достаточное количество для получения 1000 мл препарата.

Форма выпуска

Настойка

Показания

В комплексной терапии воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе артритов, артрозов.

Способ применения и дозы

Внутрь: по 5 мл (1 чайная ложка) настойки, предварительно разведенной в 1/3 стакана воды комнатной температуры, 2 раза в день до еды. Курс лечения – 2 месяца. При необходимости курс лечения можно повторить после согласования с врачом.

Противопоказания

Противопоказания Индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет. Меры предосторожности при применении С осторожностью (в связи с содержанием этилового спирта) применять больным с тяжелыми нарушениями функции печени, травмами и заболеваниями головного мозга, эпи-лепсией, при хроническом алкоголизме. Лицам, имеющим хронические заболевания, перед применением препарата обязательно проконсультироваться с врачом. Применение при беременности и в период грудного вскармливания Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания. Побочное действие В редких случаях возможны аллергические реакции, тошнота, диарея. Передозировка При применении препарата в дозах, значительно превышающих рекомендуемые, возможно алкогольное отравление. Лечение симптоматическое. Взаимодействие с другими лекарственными средствами При использовании настойки сабельника в комплексе с нестероидными противовоспалительными средствами происходит усиление терапевтического эффекта, что позволяет снизить терапевтическую дозу нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Особые указания При лечении возможно кратковременное обострение болевого синдрома, которое проходит самостоятельно, без отмены препарата. Разовая доза препарата содержит 1,58 г (2 мл) абсолютного спирта, суточная доза содержит 3,16 г (4 мл) абсолютного спирта. Не следует превышать указанную суточную дозу. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами В период лечения препаратом необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

В редких случаях возможны аллергические реакции, тошнота, диарея.

Передозировка

При применении препарата в дозах, значительно превышающих рекомендуемые, возможно алкогольное отравление. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

При использовании настойки сабельника в комплексе с нестероидными противовоспалительными средствами происходит усиление терапевтического эффекта, что позволяет снизить терапевтическую дозу нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).

Особые указания

При лечении возможно кратковременное обострение болевого синдрома, которое проходит самостоятельно, без отмены препарата. Разовая доза препарата содержит 1,58 г (2 мл) абсолютного спирта, суточная доза содержит 3,16 г (4 мл) абсолютного спирта. Не следует превышать указанную суточную дозу.

Срок хранения после открытия

2.0

Условия хранения

При температуре не выше 25 ºС. Хранить в недоступном для детей месте.