Инструкция по применению
Салипод Пластырь мозольный 2 х 10 см

Характеристики

Форма выпуска: Пластырь
Страна: Россия
Производитель: Верофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Салипод - это полоска ткани со слоем мозольной массы, приклеенная к липкой основе - лейкопластырю, прямоугольной, фигурной или круглой формы или полоска ткани со слоем мозольной массы прямоугольной, фигурной или круглой формы в комплекте с лейкопластырем или без него с защитным покрытием.Технические характеристики:На поверхности Салипода лейкопластыря мозольного не должно быть пятен, загрязнений и складок.Количественное содержание салициловой кислоты в мозольной массе должно быть от 30 до 35 %.Сопротивление отслаиванию липкой основы - Лейкопластыря Верофарм или Лейкопластыря «Унипласт фиксирующий» должно быть не менее 0,35 Н/см (для Лейкопластыря Верофарм) или не менее 0,50 Н/см (для Лейкопластыря «Унипласт фиксирующий»).Салипод лейкопластырь мозольный (ткань с мозольной массой) должен обладать микробиологической чистотой. В 1 г допускается не более: 104 аэробных бактерий, 102 дрожжевых и плесневых грибов. Бактерий семейства Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus - не допускается.Описание принципа действия:За счет компонентов, входящих в состав мозольной массы, Салипод лейкопластырь мозольный оказывает кератолитическое действие.Область применения:Десмургия.Условия применения:В стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических медицинских учреждениях и в домашних условиях.

Форма выпуска

Пластырь

Показания

Салипод лейкопластырь мозольный предназначен для использования в качестве кератолитического средства.

Способ применения и дозы

Перед наложением мозольного лейкопластыря следует сделать теплую ванну ноги и вытереть ногу досуха.Мозольный лейкопластырь на фиксирующем лейкопластыре:С полоски лейкопластыря снять защитное покрытие. Мозольный лейкопластырь (темный цвет полоски) наложить на мозоль, а липкую часть (белый цвет полоски) приклеить к коже, слегка прижав пальцами. Через два дня лейкопластырь снять. Если мозоль не размягчилась, наложение мозольного лейкопластыря повторить в том же порядке 3-4 раза.Мозольный лейкопластырь в комплекте с фиксирующем лейкопластырем: Отрезать пластырь (темного цвета) нужного размера, отделить его от защитного покрытия, наложить на мозоль и закрыть полоской фиксирующего лейкопластыря (белого цвета), шириной несколько большей, чем наложенный пластырь. Через два дня лейкопластырь снять. Если мозоль не размягчилась, наложение мозольного лейкопластыря повторить в том же порядке 3-4 раза.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря. Применение у пациентов с сахарным диабетом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции на вещества, входящие в состав изделия. При их возникновении использование пластыря необходимо прекратить.При контакте со здоровой кожей возможно ее раздражение.

Условия хранения

Хранить при температуре не ниже и не выше 25° С