Инструкция по применению
Салипод Пластырь мозольный 6 х 10 см

Характеристики

Форма выпуска: Пластырь
Страна: Россия
Производитель: Верофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Мозольный пластырь Салипод оказывает антисептическое и кератолитическое действие. Лейкопластырь для удаления сухих мозолей, натоптышей, бородавок. Салициловая кислота, содержавшаяся в составе препарата, показывает слабый антисептический, раздражающий и отвлекающий эффекты. Салициловая кислота, которая входит в состав данного мозольного пластыря Салипод, улучшает проникновение в слои кожного покрова серы, оказывая кератолитическое и противомикробное действия. Во время наружного (местного) применения данный компонент вызывает шелушение кожного покрова и гибель патогенных бактерий, которые находятся на их поверхности. Сера оказывает выраженное подсушивающее воздействие. Это препятствует развитию сопутствующих грибковой либо бактериальной инфекций. Также она несет в себе смягчающее воздействие на кожный покров, мягко удаляя чешуйки так называемых ороговевающих слоев, способствуя глубокому проникновению серы.

Состав

Активное вещество — салициловая кислота.

Форма выпуска

Пластырь

Показания

Лейкопластырь для удаления сухих мозолей, натоптышей, бородавок.

Способ применения и дозы

Перед наложением мозольного лейкопластыря следует сделать теплую ванну ноги и вытереть ногу досуха. Мозольный лейкопластырь на фиксирующем лейкопластыре: С полоски лейкопластыря снять защитное покрытие. Мозольный лейкопластырь (темный цвет полоски) наложить на мозоль, а липкую часть (белый цвет полоски) приклеить к коже, слегка прижав пальцами. Через два дня лейкопластырь снять. Если мозоль не размягчилась, наложение мозольного лейкопластыря повторить в том же порядке 3-4 раза. Мозольный лейкопластырь в комплекте с фиксирующем лейкопластырем: Отрезать пластырь (темного цвета) нужного размера, отделить его от защитного покрытия, наложить на мозоль и закрыть полоской фиксирующего лейкопластыря (белого цвета), шириной несколько большей, чем наложенный пластырь. Через два дня лейкопластырь снять. Если мозоль не размягчилась, наложение мозольного лейкопластыря повторить в том же порядке 3-4 раза. Мозольный лейкопластырь: Отрезать кусочек пластыря нужного размера, отделить его от защитного покрытия, наложить на мозоль. Пластырь закрепить обычным лейкопластырем или бинтом (продается отдельно). Через два дня пластырь снять. Если мозоль не размягчилась, наложение пластыря повторить в том же порядке 3-4 раза.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам пластыря., Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря.