Инструкция по применению
Салипод Пластырь мозольный 11 шт

Характеристики

Форма выпуска: Пластырь
Страна: Россия
Производитель: Верофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 11



Описание

Повышенная чувствительность к компонентам пластыря. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря. Предназначен для использования в качестве кератолитического средства. Эффективное средство против сухих мозолей. Предназначен для использования в качестве кератолитического средства. Эффективное средство против сухих мозолей. Надежная фиксация. Натуральная основа. Маскирующий эффект. Активное вещество — салициловая кислота. При контакте со здоровой кожей возможно ее раздражение. Перед наложением мозольного лейкопластыря следует сделать теплую ванну ноги и вытереть ногу досуха. С полоски лейкопластыря 0,95×3,8 см снять защитное покрытие. Мозольный лейкопластырь (темный цвет полоски) наложить на мозоль, а липкую часть (белый цвет полоски) приклеить к коже, слегка прижав пальцами. Через два дня лейкопластырь снять. Если мозоль не размягчилась, наложение мозольного лейкопластыря повторить в том же порядке 3–4 раза. С мозольного лейкопластыря 2,3 см (темного цвета) снять защитное покрытие; приклеить, слегка прижав пальцами, и закрепить сверху фиксирующим лейкопластырем 3,8×3,8 см (белого цвета), предварительно сняв с него защитное покрытие. Через два дня лейкопластырь снять. Если мозоль не размягчилась, наложение мозольного лейкопластыря повторить в том же порядке 3–4 раза. Мозольный пластырь оказывает антисептическое и кератолитическое действие. Активное вещество: салициловая кислота.

Состав

Для изготовления мозольной массы используются каучук натуральный, сера техническая, салициловая кислота, ланолин безводный, масло вазелиновое медицинское, канифоль сосновая, смола сосновая, присадка антиокислительная 4-метил-2,6 -дитретичный бутилфенол (агидол-1); в качестве основы для нанесения мозольной массы - ткань хлопчатобумажная; в качестве липкой основы - Лейкопластырь «Унипласт фиксирующий» или Лейкопластырь Верофарм; в качестве защитного покрытия - материал антиадгезионный или бумага силиконизированная, или пленка полиэтилентерефталатная, или пленка целлюлозная нелакированная.

Форма выпуска

Пластырь

Показания

Салипод лейкопластырь мозольный предназначен для использования в качестве кератолитического средства.

Способ применения и дозы

Перед наложением мозольного лейкопластыря следует сделать теплую ванну ноги и вытереть ногу досуха. С полоски лейкопластыря 0,95х3,8 см снять защитное покрытие. Мозольный лейкопластырь (темный цвет полоски) наложить на мозоль, а липкую часть (белый цвет полоски) приклеить к коже, слегка прижав пальцами. Через два дня лейкопластырь снять. Если мозоль не размягчилась, наложение мозольного лейкопластыря повторить в том же порядке 3-4 раза. С мозольного лейкопластыря 02х3 см (темного цвета) снять защитное покрытие; приклеить, слегка прижав пальцами, и закрепить сверху фиксирующим лейкопластырем 3,8х3,8 см (белого цвета), предварительно сняв с него защитное покрытие. Через два дня лейкопластырь снять. Если мозоль не размягчилась, наложение мозольного лейкопластыря повторить в том же порядке 3-4 раза.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения пластыря. Применение у пациентов с сахарным диабетом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции на вещества, входящие в состав изделия. При их возникновении использование пластыря необходимо прекратить. При контакте со здоровой кожей возможно ее раздражение.

Особые указания

Меры предосторожности при применении: Только для наружного применения. Не использовать по истечении срока годности. Не использовать повторно. Хранить в местах недоступных для детей. Указание возможности и особенностей применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых имеющих хронические заболевания: Исследование применения Салипода лейкопластыря мозольного для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых имеющих хронические заболевания не проводилось. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента. Сведения о возможном влиянии использования на способность управлять транспортными средствами, механизмами: Исследования о возможном влиянии Салипода лейкопластыря мозольного на способность управлять транспортными средствами, механизмами не проводились. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.