Инструкция по применению
Салвисар Мазь для наружного применения 25 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Биохимик
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Камфора+Салициловая кислота+Скипидар живичный+Яд гадюки
Количество в упаковке: 1



Описание

Салвисар®. Природное оружие против боли. Справится там, где другие бессильны! Секрет Салвисар® в тщательно подобранных натуральных компонентах, благодаря которым, мазь согревает и активирует собственные иммунокомпетентные клетки на борьбу с воспалением и болями в мышцах и суставах. Организм справляется с проблемой, активируя внутренние ресурсы. Салвисар® вызывает раздражение чувствительных рецепторов кожи и подкожной клетчатки, привлекает к месту нанесения иммунокомпетентные клетки, которые органично снижают выраженность воспалительного процесса, уменьшают боль. Мазь расширяет сосуды, улучшает питание (трофику) тканей. Все это обеспечивает длительный лечебный эффект, а не просто снятие краткосрочное симптомов. Благодаря натуральным компонентам в составе, Салвисар® безопасен даже для детей, не вызывает жжения и покраснения на коже, хорошо впитывается, не оставляет жирных следов и не оставляет следов на одежде.

Действующее вещество

Камфора+Салициловая кислота+Скипидар живичный+Яд гадюки

Состав

яд гадюки обыкновенной – 5 мышиных единиц действия, кислота салициловая – 1 г, камфора синтетическая – 3 г, скипидар живичный – 3 г. Вспомогательные вещества - эмульгатор № 1 (ЛанеттеSX) – 8 г, парафины нефтяные твердые – 3 г, вазелин медицинский – 7 г., глицерол (глицерин) – 2 г, натрия хлорид раствор для инфузий изотонический 0,9% – 8 г, вода для инъекций до 100 г.

Форма выпуска

Мазь

Показания

Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, сопровождающиеся болевым синдромом: артрит различной этиологии, артралгии, невралгии, миалгии.

Способ применения и дозы

Наружно, по 5-10 г (1-2 ч. ложки) мази по частям наносят на область болезненных участков и втирают в кожу 1 раз/сут, при сильных болях – 2 раза/сут до исчезновения болевого синдрома, но не более 10 дней без консультации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, кожные заболевания (в т.ч. аллергические и гнойничковые, нарушение целостности кожных покровов в месте нанесения препарата), активный туберкулез легких, лихорадочные состояния, общее истощение, тяжелая недостаточность мозгового и коронарного кровообращения, склонность к ангиоспазмам, тяжелая печеночная или почечная недостаточность, беременность, период грудного вскармливания, непереносимость салицилатов, детский возраст до 6 лет. С осторожностью Детский возраст от 6 до 18 лет (необходимость применения препарата у детей определяется врачом индивидуально). Указания в анамнезе на бронхиальную астму, спровоцированную приемом ацетилсалициловой кислоты или иными нестероидными противовоспалительными препаратами.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Жжение, возникающее в процессе втирания, обычно проходит через несколько минут. В единичных случаях – кожные аллергические реакции, исчезающие после отмены препарата. Во избежание побочных явлений рекомендуется предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату.

Передозировка

При применении препарата в рекомендуемой дозе о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат вызывает гиперемию кожи и рефлекторно усиливает циркуляцию крови в подкожной ткани, в связи с чем совместное применение с другими препаратами локального действия может приводить к усилению их всасывания. Использование больших количеств может повышать токсичность метотрексата и снижать терапевтический эффект гипогликемических средств. Не использовать препарат с пероральными антикоагулянтами.

Особые указания

После применения препарата необходимо тщательно мыть руки. Следует избегать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки и на поврежденную кожу. При попадании мази в глаза или на слизистые оболочки необходимо промыть их большим количеством воды.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.