Инструкция по применению
Сандра Таблетки подъязычные гомеопатические 250 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вилар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 250 мг
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

1 таблетка:Aconitum soongaricum D1 (Аконитум сунгарикум) 2.3 мгVerbascum densiflorum D1 (Вербаскум денсифлорум) 2.3 мгAlchemilla vulgaris D1 (Альхемилла вульгарис) 2.3 мгEchinacea purpurea D1 (Эхинацея пурпурэа) 2.3 мгMentha piperita D1 (Мента пиперита) 2.3 мгDaphne mezereum (Mezereum) D1 (Дафнэ мезэрэум) 2.3 мгApis mellifica (Apis) D1 (Апис меллифика) 2.3 мгAtropa belladonna (Belladonna) D1 (Атропа белладонна) 2.3 мгBryonia dioica D1 (Бриония диоика) 2.3 мгHydrargyri dichloridum (Гидраргири дихлоридум) 0.00025 мгВспомогательные вещества: сахароза 225.55 мг, желатин 1.25 мг, кальция стеарат 2.5 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

Для профилактики и в составе комплексной терапии в качестве симптоматического средства при «простудных» заболеваниях (ОРВИ) и гриппозных состояниях (лихорадка, общая слабость, головная боль) с целью повышения неспецифической сопротивляемости организма.

Способ применения и дозы

Одну таблетку препарата помещают под язык и держат во рту до полного растворения. Для лечения в первые 2-3 дня применяют по 1 таблетке каждые 2 ч (7-8 раз в сут). После снижения температуры в течение последующих 2-3 дней используют по 1 таблетке 4 раза в сут. Курс лечения 5-6 дней. Для профилактики в период вспышки ОРВИ препарат принимают по 1 таблетке 4 раза в день.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

При применении препарата взаимодействие с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Особые указания

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Информация для больных сахарным диабетом: одна таблетка препарата содержит 225.55 мг сахарозы (сахара-рафинада), что соответствует 0.019 ХЕ (хлебных единиц). Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В сухом месте