Инструкция по применению
Санорин-ксило капли назальные 0,05% 10мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Германия
Производитель: КСАНТЕР ФАРМА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ксилометазолин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,05%
Срок годности: 48

Действующее вещество

Ксилометазолин

Состав

1 мл препарата содержит: активное вещество: ксилометазолина гидрохлорид 1 мг; вспомогательные вещества: лимонной кислоты моногидрат, натрия цитрат дигидрат, глицерол, вода для инъекций

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

При местном применении практически не абсорбируется, концентрации в плазме настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами

Показания

Острый ринит, синусит, ларингит, евстахиит, риноскопия, необходимость остановки носовых кровотечений

Способ применения и дозы

Интраназально. Для детей и подростков в возрасте 2-15 лет рекомендуемая доза – по 1-2 капли в каждую ноздрю 2-3 раза в сутки. Интервал между закапываниями должен быть не менее 4 часов. Для остановки носового кровотечения в носовой ход помещают ватный тампон, смоченный раствором препарата Санорин 0,05% концентрации. Капли назальные 0,05% можно применять как дополнительное средство при лечении конъюнктивита бактериального происхождения. С этой целью Санорин закапывают по 1-2 капли в каждый конъюнктивальный мешок 3-4 раза в сутки Перед первым впрыскиванием спрея рекомендуется нажать на дозирующее устройство несколько раз до появления компактного облачка аэрозоля. Перед применением необходимо снять защитный колпачок и, удерживая флакон в вертикальном положении, ввести концевую часть устройства в носовой ход, затем быстро и резко нажать на аппликатор. Сразу после впрыскивания произвести легкий вдох носом и закрыть аппликатор защитным колпачком

Противопоказания

Повышенная чувствительность к ксилометазолину или другим компонентам препарата; - сухой ринит; - применение после гипофизэктомии или других хирургических вмешательств, осуществляемых через твердую мозговую оболочку; - детский возраст до 2 лет. Санорин-Ксило применяют с осторожностью у пациентов с артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями обмена веществ (в том числе гипертиреозом, сахарным диабетом), повышенным внутриглазным давлением (особенно при закрытоугольной глаукоме), феохромоцитомой, порфирией, гиперплазией предстательной железы, при одновременном приеме ингибиторов моноаминоксидазы (МАО) и трициклических антидепрессантов, а также во время беременности и в период лактации

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат Санорин-Ксило можно принимать при беременности только после тщательной оценки соотношения пользы и риска. Поскольку передозировка может нарушить кровоснабжение плода, в период беременности нельзя превышать рекомендуемую дозу. В период грудного вскармливания препарат Санорин-Ксило следует принимать с осторожностью. Вследствие возможного снижения выработки молока не следует превышать рекомендованную дозу

Побочные действия

Частота развития побочных эффектов классифицирована согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения: очень часто - не менее 10%; часто - не менее 1%, но менее 10%; нечасто - не менее 0,1%, но менее 1%; редко - не менее 0,01%, но менее 0,1%; очень редко - менее 0,01%. Нарушения со стороны иммунной системы: нечасто - реакция гиперчувствительности, сосудистый отек, кожная сыпь, зуд. Нарушения со стороны центральной нервной системы (ЦНС): очень редко - беспокойство, бессонница, утомляемость, вялость, апатия, головная боль, головокружение, тошнота, галлюцинации (преимущественно у детей). Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: редко - ощущение сердцебиения, тахикардия, повышение артериального давления; очень редко - аритмия. Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто - жжение, сухость слизистой оболочки носа, чихание; нечасто - после ослабления терапевтического эффекта повышенная отечность слизистой оболочки носа, носовые кровотечения. Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: очень редко - судороги (преимущественно у детей). При передозировке Санорина-Ксило могут развиваться чувство страха, тревоги, галлюцинации, судороги, снижение температуры тела, апатия, сонливость, кома, миоз, мидриаз, повышенное потоотделение, лихорадка, бледность, цианоз, тошнота, тахикардия, брадикардия, сердечная аритмия, нарушение дыхания и апноэ, резкое снижение артериального давления, отек легких, повышение артериального давления, остановка сердца. Для лечения передозировки назначают симптоматическую терапию, при случайном приеме препарата внутрь - введение активированного угля, натрия сульфата (слабительное), промывание желудка. В серьезных случаях могут быть применены неселективные альфа-адреноблокаторы для снижения артериального давления, а также интубация и искусственная вентиляция легких. Сосудосуживающие препараты противопоказаны.

Передозировка

Симптомы: чувство страха, тревоги, галлюцинации, судороги, снижение температуры тела, апатия, сонливость, кома, миоз, мидриаз, повышенное потоотделение, лихорадка, бледность, цианоз, тошнота, тахикардия, брадикардия, сердечная аритмия, нарушение дыхания и апноэ, резкое снижение артериального давления, отек легких, повышение артериального давления, остановка сердца. Лечение: при передозировке показано симптоматическое лечение под наблюдением. В серьезных случаях могут быть применены неселективные альфа-адреноблокаторы для снижения АД, а также интубация и искусственная вентиляция легких. Сосудосуживающие препараты противопоказаны. При случайном приеме умеренного или большого количества препарата внутрь следует принять активированный уголь (адсорбент) и натрия сульфат (слабительное средство), сделать промывание желудка

Взаимодействие с другими препаратами

Одновременный прием три- или тетрациклических антидепрессантов может увеличить системное воздействие ксилометазолина. При одновременном приеме ксилометазолина с ингибиторами МАО возможен риск повышения артериального давления.

Особые указания

При длительном применении Санорина-Ксило возможно ослабление терапевтического эффекта, а также повышается риск возникновения реактивной гиперемии и атрофии слизистой оболочки носа (медикаментозный ринит). Не отмечалось влияния на способность к управлению транспортом и работу с техникой. При развитии нежелательных реакций со стороны центральной нервной системы следует соблюдать осторожность при выполнении действий, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций

Срок хранения после открытия

28

Условия хранения

Не допускать замерзания