Инструкция по применению
Саридон таблетки N10

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Франция
Производитель: Байер
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Кофеин+Парацетамол+Пропифеназон
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 250 мг+150 мг+50 мг
Срок годности: 60

Описание

Белая, круглая, плоская таблетка без запаха, с фаской по краям, с линией для разлома на одной стороне, на другой стороне выдавлено SARIDON.

Действующее вещество

Кофеин+Парацетамол+Пропифеназон

Состав

1 таблетка содержит: действующие вещества: парацетамол - 250 мг, пропифеназон - 150 мг, кофеин - 50 мг; вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза 120 мг, кукурузный крахмал 21,2 мг, тальк 9,75 мг, магния стеарат 3,25 мг, формальдегид казеиг..##

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Боль различной этиологии, в том числе: головная боль, зубная боль, мигренозная боль, невралгия, миалгия, ишиас, посттравматическая и послеоперационная боль, 2 дисменорейные боли. Для снижения повышенной температуры тела при простудных и других инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Способ применения и дозы

Применяют внутрь обычно по 1 таблетке 3-4 раза в сутки. Максимальная разовая доза для взрослых 2 таблетки, суточная – 6 таблеток. Продолжительность приема не более 3 дней в качестве жаропонижающего средства и не более 5 дней в качестве обезболивающего средства. Для подростков 12-18 лет – ½-1 таблетка 2-3 раза в сутки. Таблетки рекомендуется принимать после еды, запивая большим количеством жидкости.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженные нарушения функции печени или почек, генетическое отсутствие глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, глаукома, анемия, лейкопения, повышенная возбудимость, бессонница, ишемическая болезнь сердца, стенокардия. Нежелательно применение при беременности и в период грудного вскармливания. Дети до 12 лет. Не следует сочетать с приемом алкогольных напитков.

Побочные действия

В терапевтических дозах препарат обычно хорошо переносится. Иногда возможны кожные аллергические реакции, тошнота, рвота, сердцебиение, головокружение, нарушение сна. Редко – нарушения системы крови (тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз). При длительном приеме в высоких дозах возможно гепатотоксическое и нефротоксическое действие.

Взаимодействие с другими препаратами

Следует избегать одновременного применения препарата Саридон с барбитуратами, противосудорожными средствами, рифампицином, карбамазепином и алкогольными напитками. Метоклопрамид ускоряет всасывание парацетамола. Кофеин ускоряет всасывание эрготамина. Пропифеназон усиливает действие пероральных антидиабетических средств и антикоагулянтов, снижает эффективность калийсберегающих диуретиков. Признаки острого отравления: тошнота, рвота, боли в желудке, потливость, бледность кожных покровов, тахикардия. Пострадавшему следует сделать промывание желудка, назначить адсорбенты (активированный уголь) и обратиться к врачу.

Особые указания

С осторожностью применяют у лиц пожилого возраста, больных с нарушенной функцией печени и почек. Чрезмерное употребление кофеиносодержащих продуктов (чай, кофе) на фоне лечения может вызвать симптомы передозировки.

Условия хранения

В сухом месте