Инструкция по применению
Себидин таблетки для рассасывания 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Польша
Производитель: Биттнер Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Хлоргексидин
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 5 мг+50 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Хлоргексидин

Состав

хлоргексидин 5 мгаскорбиновая кислота 50 мгВспомогательные вещества: сахароза, метилцеллюлоза, магния стеарат, тальк, краситель хинолиновый желтый (Е104), краситель кошениль красный (Е124), эссенция фруктовая.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Показания

- инфекции полости рта, горла, гортани;- воспалительные заболевания десен;- пародонтит после хирургического вмешательства;- пародонтопатия;- пародонтоз;- афтозный стоматит.

Способ применения и дозы

Медленно рассасывают по 1 таб. 4-5 раз/сут. Курс лечения - 7 дней. При необходимости назначают 3 таб./сут, в течение 21 дня.

Противопоказания

- гиперчувствительность.С осторожностью: детский возраст.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременным и кормящим женщинам следует посоветоваться с врачом перед применением препарата.

Побочные действия

Тошнота, боли в эпигастрии, аллергические реакции (кожная сыпь), нарушение вкуса, паротит, болезненность языка и слизистых оболочек; изменение цвета пломб и зубных протезов.

Взаимодействие с другими препаратами

Органические вещества (плазма, фосфолипиды) снижают эффективность.

Особые указания

Пациентам, страдающим кариесом, необходимо учитывать, что таблетки содержат сахарозу.

Условия хранения

В сухом месте