Инструкция по применению
Седальгин-Нео Таблетки 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Болгария
Производитель: ТЕВА
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Кодеин + Кофеин + Метамизол натрия + Парацетамол + Фенобарбитал
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 36

Описание

Круглые, плоские таблетки белого или почти белого цвета, с двусторонней фаской и риской на одной стороне.

Действующее вещество

Кодеин + Кофеин + Метамизол натрия + Парацетамол + Фенобарбитал

Состав

1 таблетка содержит: _действующие вещества:_ парацетамол - 300,00 мг, метамизола натрия моногидрат -150,00 мг (в пересчете на метамизол натрия - 142,00 мг), кофеин - 50,00 мг, фенобарбитал -15,00 мг, кодеина фосфат гемигидрат - 10,00 мг. _вспомогательные вещества:_ крахмал пшеничный 60,20 мг, целлюлоза микрокристаллическая 25,00 мг, повидон К25 15,00 мг, кросповидон 5,30 мг, натрия дисульфит 5,00 мг, тальк 10,00 мг, магния стеарат 4,50 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Взрослые: Кратковременное симптоматическое лечение болевого синдрома различного генеза при отсутствии адекватного ответа на его купирование при монотерапии анальгетиками: * головная и зубная боль, мигрень; * альгодисменорея; * боль при травмах, ожогах и после хирургических вмешательств; * невралгии и невриты. Дети и подростки от 12 лет: Острый болевой синдром средней интенсивности, который не может быть купирован анальгетиками первого выбора для детей при монотерапии (парацетамол или ибупрофен).

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды, запивая предпочтительно водой. _Препарат Седалъгин-Нео® применяется только по назначению лечащего врача, который должен назначить соответствующую дозу и режим приема препарата для пациента!_ Рекомендованная доза - 1 таблетка 3-4 раза в день. Максимальная разовая доза - 2 таблетки, суточная доза - 6 таблеток. Курс лечения не должен превышать 3-х дней. Если после 3~х дней лечения не достигается облегчения болевого синдрома, то пациенту/лицу, ухаживающему за пациентом, следует обратиться за рекомендациями по дальнейшему лечению к лечащему врачу. _Применение у детей младше 12 лет_ Кодеин и кодеин-содержащие препараты не следует применять у детей младше 12 лет в виду наличия риска развития опиоидной токсичности, из-за вариабельности и непрогнозируемости метаболизма кодеина до морфина.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат Седальгин-Нео® противопоказан для применения при беременности и в период грудного вскармливания.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!