Инструкция по применению
Секнидокс Таблетки 1 г 2 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Турция
Производитель: World Medicine Ilac San. ve Tic. A.S.
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Секнидазол
Количество в упаковке: 2
Дозировка действующего вещества: 1 г
Срок годности: 36.0

Описание

Секнидокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой - противомикробное и противопротозойное средство. Оказывает бактерицидное (против грамположительных и грамотрицательных анаэробных бактерий) и амебицидное (внутри- и внекишечное) действие. Секнидазол особенно активен в отношении Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica и Giardia lamblia.

Действующее вещество

Секнидазол

Состав

Активное вещество: секнидазол. Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, карбоксиметилкрахмал натрия, кальция гидрофосфат, повидон К30, магния стеарат, тальк. Состав пленочной оболочки: гипромеллоза Е-15, титана диоксид (Е171), тальк, лак алюминиевый на основе индигокармина (Е132), пропиленгликоль.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Всасывание и распределение После приема внутрь секнидазол быстро всасывается из ЖКТ. Биодоступность составляет около 80%. После приема 2 г секнидазола Cmax в плазме достигается через 3-4 ч. Секнидазол проникает через ГЭБ и плацентарный барьер, экскретируется с грудным молоком. Выведение T1/2 секнидазола из плазмы крови составляет около 25 ч. Препарат медленно выводится из организма, в основном с мочой: около 50% принятой дозы экскретируется за 120 ч.

Показания

Уретрит и вагинит, вызванные Trichomonas vaginalis, Амебиаз кишечника, вызванный Entamoeba histolytica, Амебиаз печени, вызванный Entamoeba histolytica, Жиардиаз, вызванный Giardia lamblia.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, непосредственно перед едой, запивая небольшим количеством воды. Уретрит и вагинит Взрослым - однократный прием 2 г секнидазола (2 таб.), курс лечения 1 день. Следует проводить одновременное лечение обоих половых партнеров. Амебиаз кишечника Острый амебиаз с выраженной симптоматикой (форма histolytica): взрослым - однократный прием 2 г секнидазола (2 таб.), курс лечения 1 день, детям - однократный прием дозы 30 мг/кг, курс лечения 1 день. Амебиаз без клинической симптоматики, включая очаговую и цистную формы (minuta и cystic): взрослым - 2 г секнидазола (2 таб.) в один или несколько приемов в течение 3 дней, детям - 30 мг/кг/сут в один или несколько приемов в течение 3 дней. Амебиаз печени Взрослым - 1.5 г секнидазола (1.5 таб.) в один или несколько приемов в течение 5 дней, детям - 30 мг/кг/сут в один или несколько приемов в течение 5 дней. Жиардиаз Детям - однократный прием дозы 30 мг/кг, курс лечения 1 день.

Противопоказания

Органические заболевания ЦНС, Заболевания крови (в т.ч. в анамнезе), Беременность, Период лактации, Детский возраст до 3 лет или масса тела менее 16 кг (для данной лекарственной формы), Гиперчувствительность к секнидазолу, другим производным имидазола или любому другому компоненту препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Накопленный к настоящему времени опыт недостаточен для оценки возможного фетотоксического действия секнидазола. У животных секнидазол не вызывал тератогенных эффектов. Тем не менее, поскольку секнидазол способен проникать через плацентарный барьер, а результаты, получаемые на животных, не всегда могут быть распространены на людей, не рекомендуется назначать секнидазол во время беременности. Секнидазол выводится с грудным молоком. На время лечения следует отказаться от грудного вскармливания. Были зарегистрированы случаи кандидоза слизистой оболочки полости рта и анальной области, а также случаи диареи у младенцев, которые были на грудном вскармливании у матерей, получавших производные имидазола (но не секнидазол).

Побочные действия

Аллергические реакции: крапивница, сыпь, ангионевротический отек, очень редко - анафилактическая реакция. Со стороны крови и лимфатической системы: умеренная обратимая лейкопения. Со стороны нервной системы: головокружение, нарушение координации движений (атаксия), снижение кожной чувствительности (парестезия), периферическая невропатия. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, боли в области желудка, "металлический" привкус во рту, глоссит, стоматит. Прочие: лихорадка. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, пациенту следует сообщить об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение: симптоматическое. Прием препарата следует прекратить, необходимо очистить желудок, принять активированный уголь, пациенту следует немедленно обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Дисульфирам: при совместном применении секнидазола с дисульфирамом возможны психотические реакции, состояние спутанности сознания. Антикоагулянты для приема внутрь (например, варфарин): секнидазол усиливает действие непрямых антикоагулянтов (производных кумарина или индандиона) и повышает риск возникновения кровотечений за счет снижения печеночного метаболизма антикоагулянтов. Этанол: сочетание с этанолом вызывает симптомы "антабусной реакции" (спазмы в животе, тошнота, рвота, головная боль, "приливы жара", тахикардия).

Особые указания

При печеночном амебиазе в фазе нагноения прием препарата следует сочетать с дренажным удалением гноя или с удалением абсцессов. При одновременном приеме непрямых антикоагулянтов необходимо чаще определять протромбиновое время и осуществлять мониторинг МНО и при необходимости корректировать дозу антикоагулянта на протяжении всего курса терапии секнидазолом и в течение 8 дней после окончания терапии. На время терапии секнидазолом и в течение 5 дней после ее завершения необходимо отказаться от употребления алкогольных напитков и лекарственных препаратов, содержащих этанол. При лечении трихомонадного вагинита у женщин и трихомонадного уретрита у мужчин пациенты должны воздерживаться от половой жизни. Обязательно одновременное лечение половых партнеров. Лечение не прекращается во время менструации. Следует избегать применения препарата у пациентов с заболеванием крови в анамнезе. Длительное применение желательно проводить под контролем формулы крови. При лейкопении возможность продолжения лечения зависит от риска развития инфекционного процесса. Появление атаксии, головокружения и любое другое ухудшение неврологического статуса больных требует прекращения лечения. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Возможны такие побочные эффекты, как головокружение и нарушение координации движений. При появлении этих побочных действий пациентам рекомендуется воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих концентрации внимания и быстроты реакции.

Условия хранения

При комнатной температуре