Инструкция по применению
Селектра Таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг 56 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Мальта
Производитель: Актавис
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Эсциталопрам
Количество в упаковке: 56
Дозировка действующего вещества: 10 мг



Действующее вещество

Эсциталопрам

Состав

Эсциталопрама оксалат 12.78 мг, что соответствует содержанию эсциталопрама 10 мг Вспомогательные вещества: просолв SMCC .90/HD90 - 147.42 мг (целлюлоза микрокристаллическая - 144.47 мг, кремния диоксид - 2.95 мг), кроскармеллоза натрия - 9 мг, тальк - 9 мг, магния стеарат - 1.8 мг. Состав пленочной оболочки: опадрай белый (Opadry 03F28446 White) - около 5.4 мг (гипромеллоза 6cP - 3.29 мг, титана диоксид - 1.31 мг, макрогол 6000 - 0.8 мг).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

панические состояния с агорафобией или без таковой . расстройства депрессивного характера любого уровня тяжести.

Способ применения и дозы

Инструкция по применению Селектры рекомендует однократный суточный пероральный (внутренний) прием таблеток пациентам, достигшим возраста 15-ти лет. Панические состояния На протяжении первых 7-ми суток терапии рекомендуют прием суточной дозы 5 мг, с дальнейшим увеличением до 10 мг. Согласуясь с индивидуальной чувствительностью пациента к эсциталопраму можно увеличить суточную дозу до максимума – 20 мг. Терапия длительная, максимальная эффективность лечения наблюдается, как правило, через 3 месяца. Депрессивные состояния Как правило, назначают 10 мг Селектры однократно в 24 часа. Согласуясь с индивидуальной чувствительностью пациента к эсциталопраму можно увеличить суточную дозу до максимума – 20 мг. Антидепрессивная эффективность в большинстве случаев развивается на протяжении 2-й – 4-й недели. С целью закрепления положительного эффекта, после нивелирования симптоматики депрессии, необходимо продолжать лечение еще 6 месяцев. Возраст после 65-ти лет Рекомендуемые суточные и максимальные дозы должны быть понижены вдвое. Патологии почек При КК больше 30 мл/мин нет необходимости корректировать дозировки Селектры. В обратном случае применяют минимальные дозы эсциталопрама, с постепенным их увеличением согласно индивидуальной реакции пациента. Патологии печени Начальная суточная дозировка Селектры равняется 5 мг. Согласуясь с индивидуальной чувствительностью пациента к эсциталопраму можно увеличить суточную дозу до максимума – 10 мг. Пониженная активность цитохрома CYP2C19 Пациенты с недостаточной активностью CYP2C19, на протяжении 14 суток, требуют назначения начальной суточной дозы 5 мг. Согласуясь с индивидуальной чувствительностью пациента к эсциталопраму можно увеличить суточную дозу до максимума – 10 мг.

Противопоказания

грудное вскармливание . гиперчувствительность . возраст до 15-ти лет . параллельное применение с ингибиторами МАО . беременность. Относительные: недостаточность почек, при КК меньше 30 мл/мин . возраст 15-18 лет . маниакальные расстройства . гипомания . неконтролируемая эпилепсия . сахарный диабет . суицидальная депрессия . пожилой возраст . предрасположенность к кровотечениям . цирроз печени . сочетаемое применение с этанолом . препаратами, вызывающими гипонатриемию . уменьшающими судорожную готовность . метаболизирующимися цитохромом CYP2C19

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Чаше всего побочные эффекты наблюдались на протяжении первых 14-ти суток терапии, после чего их активность и частота проявления понижалась или полностью прекращалась. ЦНС: деперсонализация . головокружение . панические атаки . слабость . тревога . бессонница . повышенная раздражительность . сонливость . ажитация . судороги . расстройства зрения . тремор . спутанность сознания . двигательные нарушения . галлюцинации . серотониновый синдром (миоклонус, гипертермия, тремор, ажитация) . маниакальные расстройства. ЖКТ: сухость в ротовой полости . диарея . тошнота . расстройства вкусовых ощущений . рвота . понижение аппетита . запор. Эндокринная система: галакторея . понижение секреции АДГ. Сердечно-сосудистая система: ортостатическая гипотензия. Мочеполовая система: аноргазмия (у женщин) . понижение либидо . нарушение эякуляции . задержка мочи . импотенция. Кожные покровы: экхимоз . сыпь . пурпура . зуд . ангионевротический отек. Лабораторные показатели: изменение печеночной функции . гипонатриемия. Аллергические реакции: анафилактические проявления. Другие: гипертермия . повышенная потливость . синуситы . миалгия . артралгия . синдром отмены (при внезапном прекращении лечения).

Особые указания

Чаше всего побочные эффекты наблюдались на протяжении первых 14-ти суток терапии, после чего их активность и частота проявления понижалась или полностью прекращалась. ЦНС: деперсонализация . головокружение . панические атаки . слабость . тревога . бессонница . повышенная раздражительность . сонливость . ажитация . судороги . расстройства зрения . тремор . спутанность сознания . двигательные нарушения . галлюцинации . серотониновый синдром (миоклонус, гипертермия, тремор, ажитация) . маниакальные расстройства. ЖКТ: сухость в ротовой полости . диарея . тошнота . расстройства вкусовых ощущений . рвота . понижение аппетита . запор. Эндокринная система: галакторея . понижение секреции АДГ. Сердечно-сосудистая система: ортостатическая гипотензия. Мочеполовая система: аноргазмия (у женщин) . понижение либидо . нарушение эякуляции . задержка мочи . импотенция. Кожные покровы: экхимоз . сыпь . пурпура . зуд . ангионевротический отек. Лабораторные показатели: изменение печеночной функции . гипонатриемия. Аллергические реакции: анафилактические проявления. Другие: гипертермия . повышенная потливость . синуситы . миалгия . артралгия . синдром отмены (при внезапном прекращении лечения).