Инструкция по применению
Селмевит Таблетки 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60



Описание

БАД «Селмевит®» рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витаминов A, E, C, группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B12), минеральных элементов (селена, железа, цинка, марганца, меди), источника рутина. Содержит магний, витамин B9, L-метионин. Комплекс витаминов, минералов и биологически активных веществ, играющих важную роль в поддержке энергетического обмена и в системе антиоксидантной защиты организма, усилении адаптационных возможностей организма, в поддержании работоспособности и хорошего самочувствия при повышенных физических и умственных нагрузках, в условиях стресса и психоэмоционального напряжения, в поддержке когнитивных нкций, в том числе памяти.

Состав

Состав на одну таблетку Действующие вещества: Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая 102 - 227,50 мг, коповидон - 14,71 мг, лимонной кислоты моногидрат - 10,8 мг, кальция стеарат - 5,34 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 1,40 мг, Колликоат Протект (макрогола и поливинилового спирта сополимер 55-65%, поливиниловый спирт 35-45%, диоксид кремния 0,1-0,3%) - 0,22 мг. Состав пленочной оболочки: сукралоза - 0,10 мг, краситель азорубин (Е 122) - 0,03 мг, Опадрай II белый - 39,87 мг [гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) - 12,36 мг, итана диоксид - 10,77 мг, полидекстроза - 10,36 мг, тальк - 2,79 мг, декстрин (мальтодекстрин) - 1,99 мг, глицерол (глицерин) - 1,60 мг]

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Профилактика и лечение витаминно-минеральной недостаточности, в том числе возникающей:

Способ применения и дозы

Перед началом лечения следует проконсультироваться с врачом. Внутрь после еды. Взрослым и детям старше 12 лет с целью профилактики витаминно-минеральной недостаточности - по 1 таблетке в сутки. Курс приема 30 дней. Возможны повторные курсы по рекомендации врача. Взрослым и детям старше 12 лет для восполнения дефицита витаминов и минеральных веществ - по 1 таблетке 2 раза в сутки. Курс приема 30 дней.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Беременность, период грудного вскармливания. Детский возраст до 12 лет. Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Аллергические реакции к компонентам препарата.

Передозировка

Симптомы: тошнота, слабость, желудочно-кишечные расстройства. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение: активированный уголь внутрь, промывание желудка, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Аскорбиновая кислота повышает концентрацию в крови салицилатов, этинилэстрадиола, бензилпенициллина и тетрациклинов, снижает концентрацию пероральных контрацептивов, уменьшает антикоагулянтный эффект производных кумарина. Препараты кальция, колестирамин, неомицин уменьшают всасывание ретинола ацетата, #-токоферола ацетат усиливает эффект сердечных гликозидов, стероидных и нестероидных противовоспалительных препаратов.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (банка в пачке) или (контурная ячейковая упаковка в пачке). Хранить в недоступном для детей месте.